

غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن شیرازی (*Zataria multiflora*) در بچه ماهی قزلآلای رنگین کمان پرورشی (*Oncorhynchus mykiss*)

مصطفی شریف روحانی^(۱)*؛ مسعود حقیقی^(۲) و حسین عصاییان^(۳)

rohani@ifro.ir

۱ - مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶

۲ و ۳ - مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، تنکابن، صندوق پستی: ۴۶۸۱۵-۴۶۷

تاریخ دریافت: آبان ۱۳۸۹ تاریخ پذیرش: تیر ۱۳۹۰

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین غلظت نیمه کشنده (LC₅₀) اسانس آویشن شیرازی طی مدت زمان ۹۶ ساعت روی بچه ماهی قزلآلای رنگین کمان پرورشی (*Oncorhynchus mykiss*) بود. روش تحقیق براساس روش استاندارد OECD و بصورت ساکن انجام شد. از ۱۸۰ بچه ماهی قزلآلای رنگین کمان پرورشی با میانگین ($\bar{x} \pm SD$) وزنی 5 ± 1 گرم بصورت تصادفی در ۵ گروه تیمار و یک گروه شاهد و هر گروه با ۳ تکرار و هر تکرار با ۱۰ عدد بچه ماهی استفاده شد. در طول مدت آزمایش میانگین ($\bar{x} \pm SD$) دمای آب معادل 16 ± 1 درجه سانتیگراد، اکسیژن محلول معادل 7 ± 0.2 میلیگرم در لیتر و میزان pH برابر با 8 ± 0.4 بود. برای تعیین محدوده کشنده‌گی مقادیر اسانس آویشن شیرازی به روش تصاعد هندسی و بر پایه ppm (قسمت در میلیون) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن شیرازی طی مدت زمان ۹۶ ساعت برای بچه ماهی قزلآلای رنگین کمان پرورشی، 13.6 ppm می‌باشد. ضریب درمانی (Therapeutic index)، اسانس آویشن شیرازی باریک است یعنی با کمترین افزایش غلظت، اثرات سمی آن ظاهر می‌شود.

لغات کلیدی: گیاهان دارویی، قزلآلای رنگین کمان، سمیت، ایران

*نویسنده مسئول

4 مقدمه

گیاه است که دارای اثرات ضد باکتری، ضد ویروسی، آنتی اکسیدان و ضد التهابی است (Parnham & Kesselring, 1985; Mohagheghzadeh et al., 2004; Osakabe et al., 2004).

در آنالیز شیمیایی اسانس آویشن شیرازی بکار گرفته شده در این تحقیق که در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به روش کروماتوگرافی گاز مایع متصل به طیف سنج جرمی (GLC/MS) انجام شد، بیشترین مواد تشکیل دهنده آن را فلاونوپیدها عمدتاً تیمول به میزان ۳۹/۶۷ درصد، کارواکرول ۳۶/۲۱ درصد، پاراسیمن ۱۰/۶۲ درصد، کارواکرول متیل استر ۱/۷۷ درصد، لینالول ۱/۷۶ درصد، بتا-کاریوفیلین ۰/۴۸ درصد تشکیل می‌دادند. تیمول و کارواکرول مجموعاً نزدیک به ۷۶ درصد ترکیبات این اسانس را تشکیل می‌دادند که خاصیت ضدغذایی کنندگی دارند (جدول ۱).

این گیاه در طب سنتی ایران بعنوان ضدغذایی کننده، بی‌حس‌کننده و ضد اسپاسم استفاده می‌شود. اثرات ضد قارچی (شريف روحاني، ۱۳۸۳)، آرامبخشی و بیهوده‌کنندگی اسانس آویشن شیرازی (شريف روحاني و همكاران، ۱۳۸۶) در ماهیان گزارش شده است.

ماهیان از جمله موجودات آبرزی هستند که بدليل ارزش غذایی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردارند. لذا به منظور جلوگیری از مسمومیت آنها به هنگام استفاده از هر نوع مواد طبیعی، دارویی یا شیمیایی، ضروری است که آزمایش‌های زیست‌سنگی (Bioassay) روی آنها انجام شود. هدف از این تحقیق، تعیین غلظت نیمه کشنده ۹۶ ساعته اسانس آویشن شیرازی روی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (*Oncorhynchus mykiss*) بود.

آویشن شیرازی (*Zataria multiflora*). گیاهی معطر و از تیره نعناع است. این گیاه در مناطق نجف آباد اصفهان، کلاه گزی، شاه کوه، یزد، دزفول، فیروزآباد، کوه سیواند، بین زند و کرمان، خاش به سمت ابرانشهر و تنگه سرخ پراکنده است (زرگري، ۱۳۷۱). سرشاخه‌های هوایی این گیاه حاوی اسانس روغنی، تانن‌ها، ساپونین‌ها و مواد ضد عفونی کننده است.

ترکیبات روغن اصلی گیاه آویشن شیرازی از طریق کروماتوگرافی گاز مایع (GLC)، کروماتوگرافی ستون (CC)، رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)، و کروماتوگرافی گاز مایع متصل به طیف سنج جرمی (GLC/MS) مورد مطالعه قرار Shafiee & Javidnia, 1997; Ebrahimzadeh et al., 2003; Mohagheghzadeh et al., 2000; Shaiq Ali et al., 2000. دو ماده فعال و مهم این گیاه، تیمول و کارواکرول هستند. تیمول نوعی فل کننده است و در فرآورده‌های دارویی بعنوان ماده ثابت کننده مصرف می‌شود. در غربالگری فیتوشیمیایی از عصاره اتانولی این گیاه به شناسایی فلاونوپیدها (Martinez-Vazquez et al., 1996; Ramesh et al., 1998) کرد که عمدتاً تیمول، کارواکرول، پی-سیمن، لینالول و گاما-ترپین بودند (Mohagheghzadeh et al., 2000). اثر Antinociceptive (کاهش حساسیت به تحريكات دردناک) انفزوزیون آبی و عصاره اتانولی آویشن شیرازی و نیز عصاره هیدروالکلی قسمتهای هوایی این گیاه در مosh صحرایی (Rat Hosseinzadeh et al., 2000; Ramezani et al., 2004; Jaffary et al., 2004) اثرات نشان داده شده است (Ramezani et al., 2004; Jaffary et al., 2004). ضد دردی و Antinociceptive عصاره آویشن شیرازی را به فلاونوپیدها نسبت می‌دهند (Hosseinzadeh et al., 2000; Ramezani et al., 2004; Jaffary et al., 2004; Martinez-Vazquez et al., 1996; Ramesh et al., 1998) اميد رزمارینیک یکی دیگر از مواد فعال موجود در روغن اصلی این

جدول ۱: آنالیز مواد تشکیل دهنده و میزان درصد آنها در اسانس آویشن شیرازی مورد استفاده در این تحقیق

ردیف	نام ماده شیمیایی	ردیف	میزان درصد	نام ماده شیمیایی	ردیف
۱	Alpha-Pinene	۲۳	۰/۶۵	Carvacrol Methylether	۱/۷۷
۲	Camphene	۲۴	۰/۰۴	Thymol	۳۹/۶۷
۳	Beta-Pinen	۲۵	۰/۱۷	Carvacrol	۳۶/۲۱
۴	3-Octanone	۲۶	۰/۵۰	Thymol Acetate	۰/۵۳
۵	Myrcene	۲۷	۰/۳۰	Carvacrol Acetate	۰/۶۹
۶	3-Octanol	۲۸	۰/۱۳	Isolongifolene	۰/۰۴
۷	Alpha-Phellandrene	۲۹	۰/۰۱	Beta-Caryophyllene	۱/۴۸
۸	Delta 3-Carene	۳۰	۰/۰۲	Calarene	۰/۰۳
۹	Alpha-Terpinene	۳۱	۰/۲۶	Aromadendrene	۰/۴۴
۱۰	Para Cymene	۳۲	۱/۰۲	Alpha-Humulene	۰/۰۹
۱۱	1,8-Cineole	۳۳	۰/۴۱	Alloaromadendrene	۰/۰۴
۱۲	Gamma-Terpinene	۳۴	۰/۰۶	Beta-Guaiene	۰/۰۷
۱۳	Cis-Sabinene Hydrate	۳۵	۰/۰۳	Ledene	۰/۲۱
۱۴	Linalool Oxide	۳۶	۰/۰۳	Cis-Calamenene	۰/۰۲
۱۵	Alpha, 4-Dimethylstyrene	۳۷	۰/۰۸	Dodecanoic Acid	۰/۱۰
۱۶	Linalool	۳۸	۱/۷۶	Spathulenol	۰/۳۶
۱۷	Cis-Thujone	۳۹	۰/۰۵	Caryophyllene Oxide	۰/۷۸
۱۸	Trans-Thujone	۴۰	۰/۰۲	Vulgarol	۰/۰۶
۱۹	Bornelol	۴۱	۰/۱۵	Myristic Acid	۰/۰۳
۲۰	Terpinen-4-ol	۴۲	۰/۰۶	Di-(2-ethylhexyl) Phthalate	۰/۰۳
۲۱	Alpha-Terpineol	۴۳	۰/۶۱	Oleic Acid	۰/۰۸
۲۲	Thymol Methylether		۰/۸۰		

مواد و روش کار

ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (*Oncorhynchus mykiss*) میانگین (±SD) وزنی ۵±۱ گرم در ۵ گروه تیمار و یک گروه شاهد و هر گروه با ۳ تکرار و هر تکرار با ۱۰ عدد ماهی بصورت تصادفی قرار داده شدند. در طول مدت آزمایش دمای آب ۱۶±۱ درجه سانتیگراد، اکسیژن محلول ۷±۰/۲ میلی گرم در لیتر و میزان pH معادل با ۸ بود. در طول دوره آزمایش آب موجود در ترافها بوسیله یک دستگاه کمپرسور هوا، هواده می شدند.

اسانس آويشن شيرازی با خلوص ۱۰۰ درصد از شرکت باریج اسانس تهیه شد. برای تعیین غلظت نيمه کشنده (LC₅₀) اسانس Organization Economic Cooperation and Development (OECD, TRC, 1984) بصورت ساکن استفاده شد که در آن غلظت‌های اسانس آويشن شيرازی در طول دوره آزمایش در محیط ترافها ثابت بود. ابتدا از غلظت‌های ۵۰ ppm و ۱۰۰ ppm استفاده شد که موجب تلفات ۱۰۰ درصدی ماهیان در عرض ۲۴ ساعت گردید. برای تعیین محدوده کشنده اسانس آويشن شيرازی ابتدا از غلظت ۵ ppm که پایین‌ترین غلظت مورد نظر بود، استفاده گردید. سپس از مقادیر ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۲۵ قسمت در میلیون که به شکل تصاعد هندسی محاسبه گردید، استفاده شد. در طول دوره آزمایش با هر یک از غلظت‌های یاد شده عالیم رفتاری ماهی‌ها و تعداد تلفات در ۷۲، ۴۸، ۲۴ و ۹۶ ساعت پس از مجاورت ماهی با اسانس آويشن شيرازی ثبت شد.

همچنین هر قدر که بر غلظت اسانس آويشن شيرازی افزوده می شد میزان ترشح موکوس در سطح بدن ماهی افزایش داشت که این افزایش ترشح موکوس با غلظت‌های ۵۰ ppm و ۱۰۰ ppm ۱۰۰ آشکارتر بود.

نتایج

نتایج این تحقیق نشان داد که میزان حداقل و حداکثر غلظت کشنده برای ماهیان ۵-۲۵ ppm بود. در واقع محدوده اثر اسانس آويشن شيرازی در غلظتی که هیچگونه تلفاتی نداشت و در غلظتی که تلفات ۱۰۰ درصدی را برای ماهیان به همراه داشت محدوده کشنده تعیین شد. جدول ۲، تأثیر غلظت‌های مختلف اسانس آويشن شيرازی را در فواصل زمانی ۷۲، ۴۸، ۲۴ و ۹۶ ساعت پس از مجاورت با ماهی نشان می‌دهد. مصرف غلظت ۵ ppm اسانس آويشن شيرازی تا ۹۶ ساعت، هیچگونه تلفاتی را همراه نداشت. غلظت ۱۰ ppm تا ۴۸ ساعت تلفاتی نداشت ولی تعداد تلفات در ساعات ۷۲ و ۹۶ بترتیب ۱ و ۳ عدد بود. تلفات در غلظت‌های ۱۵ ppm و ۲۰ ppm از همان ۲۴ ساعت اول ولی با درجات مختلف وجود داشت. در غلظت ۲۵ ppm، تمام ماهی‌ها در ۲۴ ساعت اول تلف شدند (جدول ۲). غلظت نيمه کشنده (LC₅₀) ۹۶ ساعته اسانس آويشن شيرازی برای بچه ماهی‌های قزل آلای رنگین کمان پرورشی مورد آزمایش، ۱۳/۶ ppm تعیین شد. نتایج بدست آمده نشان داد که مجاورت بچه ماهی‌های قزل آلای رنگین کمان پرورشی با غلظت کمتر از ۱۰ ppm اسانس آويشن شيرازی برای مدت ۹۶ ساعت هیچگونه عوارضی برای ماهی نداشت.

همچنین هر قدر که بر غلظت اسانس آويشن شيرازی افزوده می شد میزان ترشح موکوس در سطح بدن ماهی افزایش داشت که این افزایش ترشح موکوس با غلظت‌های ۵۰ ppm و ۱۰۰ ppm ۱۰۰ آشکارتر بود.

جدول ۲: تأثیر غلظت‌های مختلف اسانس آويشن شيرازی بر میزان بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (*Oncorhynchus mykiss*)

اسانس آويشن	لکاریتم غلظت	تعییرات نسبت به شاهد						۹۶ ساعت						۲۲ ساعت						۴۸ ساعت						غلظت اسانس آويشن شيرازی (ppm)	تیمار
		۹۶ ساعت	۷۲ ساعت	۴۸ ساعت	۲۴ ساعت	تعداد ماهی زنده	تعداد ماهی مرد																				
.	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	شاهد	
۰/۷	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۵	۱	
۱	-۱۰	-۳/۳	۰	۰	۲۷	۳	۲۹	۱	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۱۰	۲	
۱/۲	-۶۰	-۵۰	-۴۳/۴	-۲۰	۱۲	۱۸	۱۵	۱۵	۱۷	۱۳	۲۴	۶	۱۷	۱۳	۲۴	۶	۱۷	۱۳	۲۱	۹	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۳		
۱/۳	-۷۳/۳	-۵۶/۶	-۴۳/۴	-۳۰	۸	۲۲	۱۳	۱۷	۱۷	۱۷	۱۳	۲۱	۹	۱۷	۱۳	۲۱	۹	۱۷	۱۳	۲۱	۹	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۴	
۱/۴	-۱۰۰	-۱۰۰	-۱۰۰	-۱۰۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۲۵	۵

بحث

۶۰ درصد رسید. غلظت ۲۰ ppm، طی ۲۴ ساعت اول ۳۰ درصد تلفات داشت که طی ۹۶ ساعت به بیش از ۷۳ درصد رسید. حال آن که غلظت ۲۵ ppm، در همان ۲۴ ساعت اول موجب تلفات ۱۰۰ درصدی بچه ماهی‌های مورد آزمایش شد.

تاکنون از انسانس آویشن شیرازی جهت اثرات ضد قارچی آن بر روی تخم انواعی از ماهیان مورد آزمایش قرار گرفته است (شریف روحانی، ۱۳۸۳). همچنین گزارش شده است که مقدار ۱۰۰ ppm این ماده روی تخم ماهی قزل آلا سمیتی را ایجاد نکرده است (شریف روحانی، ۱۳۸۳)، ولیکن مقدار LC_{50} آن گزارش نشده است. انسانس آویشن شیرازی از ترکیبات متعددی تشکیل شده است (جدول ۱). تیمول و کارواکرول دو ترکیب عمده انسانس روغنی آویشن شیرازی را تشکیل می‌دادند. این که سمیت حاد ناشی از مصرف انسانس روغنی آویشن شیرازی روی جانوران آبزی (ماهی و میگو) بر اثر کدامیک از ترکیبات تشکیل‌دهنده این انسانس باشد هنوز مشخص نشده است و در این راستا پیشنهاد می‌شود که تحقیقاتی صورت گیرد. اثرات ضد دردی و Antinociceptive عصاره آویشن شیرازی را به Hosseinzadeh *et al.*, 2000; Ramezani *et al.*, 2004; Jaffary *et al.*, 2004; Martinez-Vazquez *et al.*, 1996; Ramesh *et al.*, 1998. عمدۀ فلاونوپییدهای انسانس آویشن شیرازی، تیمول، کارواکرول، بی-سیمین، لینالول و گاما-ترپین می‌باشند. پیشنهاد می‌شود که اثر مسمومیت حاد این انسانس در آبزیان در نتیجه وجود دو ترکیب تیمول (نوعی فنل است که در فرآورده‌های دارویی بعنوان ثابت کننده بکار می‌رود و دارای اثر ضد عفونی کنندگی است) و کارواکرول باشد. هر چند که اخیراً سمیت حاد و مقدار LC_{50} فلاونوپیید *Melaleuca alternifolia* (tea tree) روی بچه ماهی قزل آلا رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) نشان داده شده است (Hammera *et al.*, 2006).

در این تحقیق مشخص شد که ضریب درمانی (Therapeutic index) انسانس آویشن شیرازی باریک است

اگرچه تاکنون انسانس آویشن شیرازی بعنوان ماده ضد میکروبی، ضد اسپاسم، بیحس کننده و بیهوش کننده مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و بررسی‌های تحقیقاتی آن رو به افزایش است، ولیکن در ارتباط با اینمی و سمیت آن اطلاعات چندانی وجود ندارد. هدف از این تحقیق یافتن غلظت نیمه کشنده (LC_{50}) ۹۶ ساعته انسانس روغنی آویشن بر روی بچه ماهی‌های (*Oncorhynchus mykiss*) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت نیمه کشنده (LC_{50}) ۹۶ ساعته انسانس روغنی آویشن شیرازی بر روی بچه ماهی‌های قزل آلا رنگین کمان پرورشی، مقدار غلظت انسانس آویشن شیرازی برای ایجاد ۵۰ درصد تلفات در جمعیت ماهی‌ها کمتر می‌شود یعنی رابطه معکوس وجود دارد. در آزمایش‌های انجام شده میزان اکسیژن محلول آب در قبل و پس از آزمایش با غلظت‌های یکسان انسانس آویشن شیرازی تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. ولی هر قدر که بر غلظت انسانس افزوده می‌شد میزان ترشح موکوس در سطح بدن ماهی افزایش داشت که این افزایش ترشح موکوس با غلظت‌های ۵۰ ppm و ۱۰۰ ppm آشکارتر بود. ترشح بیش از حد موکوس، مانع از انتقال اکسیژن آب به مویرگ‌های آبششی گردیده و با ایجاد اختلال تنفسی و دیگر عوارض، موجب تلفات بچه ماهی‌ها شده است. هر قدر میزان غلظت انسانس آویشن شیرازی و زمان مجاورت بچه ماهی‌ها با آن کمتر بود، به همان اندازه نیز ترشح موکوس و عوارض و تلفات ناشی از آن کمتر بود و بالعکس. بنابراین میزان ترشح موکوس در بچه ماهی‌های قزل‌الا رنگین کمان پرورشی به میزان انسانس آویشن شیرازی و زمان مجاورت با آن وابسته بود. غلظت‌های کمتر از ۱۰ ppm نه تنها عارضه‌ای برای بچه ماهی‌ها نداشت، بلکه موجب آرامش بچه ماهی‌های مورد آزمایش گردید. غلظت ۱۰ ppm انسانس آویشن شیرازی طی ۹۶ ساعت مجاورت بچه ماهی‌ها با این غلظت تنها ۱۰ درصد از ماهیان مورد آزمایش تلف شدند. ولی در غلظت ۱۵ ppm درصد تلفات طی ۲۴ ساعت اول ۲۰ درصد و طی ۹۶ ساعت به

- Chemical composition of the essential oil and supercritical CO₂ extracts of *Zataria multiflora* Boiss. Food Chemistry, 83:357-361.
- Finney D.J., 1971.** Probit Analysis. Cambridge University Press.
- Finney D.J. 1978.** Statistical method in biological assay. Charles Griffin & Co.
- Hammera, K.A., Carsona C.F., Riley a,b, T.V. and Nielsen J.B., 2006.** A review of the toxicity of *Melaleuca alternifolia* (tea tree) oil. Food and Chemical Toxicology. 44:616–625.
- Hosseinzadeh H., Ramezani M. and Salmani G.A., 2000.** Antinociceptive, anti inflammatory and acute toxicity effects of *Zataria multiflora* Boiss extracts in mice and rats. Journal of Ethnopharmacology, 73(3): 379-385.
- Jaffary F., Ghannadi A. and Siahpoush A., 2004.** Antinociceptive effects of hydroalcoholic extract and essential oil of *Zataria multiflora*. Fitotrapia, 75:217-220.
- Martinez-Vazquez M., Ramirez Apan T.O., Aguilar H. and Bye R., 1996.** Analgesic and antipyretic activities of an aqueous extract and of the flavon linarin of *Buddleia cordata*. Planta Medicine. 62:137-140.
- Mohagheghzadeh A., Shams-Ardekani M. and Ghannadi A., 2000.** Volatile constituents of callus and flower-bearing tops of *Zataria multiflora* Boiss (Lamiaceae). Flavour Fragr Journal. 15:373-376.
- Mohagheghzadeh A., Shams-Ardekani M., Ghannadi A. and Minacian M., 2004.** Rosmarinic acid from *Zataria multiflora* tops and *in vitro* cultures. Fitoterapia, 75:315-321.
- يعنى با کمترین افزایش غلظت ممکن است که علايم مسموميت با آن ظاهر شود. علائم مسموميت با رفتار غيرطبيعي ماهى شامل افزایش فعالیت، افزایش تحریک پذیری، شناي با شتاب و بى هدف در جهات مختلف و در مسیرهای کوتاه، عدم تعادل و قرار گرفتن ماهى به پشت و فرو رفتن ماهى در عمق آب، انقباض شدید عضلات و بدنال آن ایجاد انحنای ستون فقرات و بالاخره مرگ همراه بود. اين رفتارهای غير طبيعى در ماهى با هواهی و اكسیژن رسانی آب به تأخير افتاد و با شدت خفیفتری ایجاد گردید. لذا برای جلوگیری از ایجاد مسموميت، لازم است که در بکارگیری اسانس آویشن شیرازی در صنعت پرورش ماهى به مقدار و مدت زمان مصرف آن توجه کافی نمود. از آنجا که این ماده منشاء طبيعى دارد لذا سازگار با محیطزیست است و ایجاد آلودگی نمی‌کند. همچنان، این گیاه جهت مصارف دارویی و غذایی در انسان استفاده می‌شود و لذا مصرف آن در صنعت پرورش ماهی مشکلی را برای مصرف کنندگان ماهی به همراه نخواهد داشت.
- در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از غلظت‌های کمتر از 10 ppm اسانس آویشن شیرازی برای ضد عفونی نمودن آب و کاهش بار میکروبی سطح بدن ماهی و نیز ایجاد آرامش قبل از هرگونه عمل تنفسی در ماهی مفید می‌باشد.
- ### منابع
- زرگري، ع.، ۱۳۷۱. گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، صفحات ۱ تا ۵۷.
- شريفروحاني، م؛ حقيقى، م؛ عصايبان، ح. و لشتوكايانى، غ.ر، ۱۳۸۶. بررسى اثر بهوشى اسانس آویشن شیرازى بر ماهى آزاد دریای *Zataria multiflora* Boiss. (Labiatae) و ماهى قزلآلای رنگین کمان خزر (*Salmo trutta caspius*) (Oncorhynchus mykiss) پرورشى مجله علمى شيلات ايران، سال شانزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶، صفحات ۹۹ تا ۱۰۶.
- Ebrahimzadeh H., Yamini Y., Sefidkon F., Chaloosi M. and Pourmortazavi, SM., 2003.

Osakabe N., Yasuda A., Natsume M. and Yoshikawa T., 2004. Rosmarinic acid inhibits epidermal inflammatory responses: Anti-carcinogenic effect of *Perilla frutescens* extract in the murine two stage skin model. *Carcinogenesis*, 25:549-557.

Parnham M.J. and Kesselring K., 1985. Rosmarinic acid. *Drug Future*. 10:756-757.

Ramesh M., Rao YN., Rao A.V., Prabhakar M.C., Muralidhar N., 1998. Antinociceptive and anti-inflammatory activity of a flavonoid isolated from *Caralluma attenuate*. *Journal of Ethnopharmacol*, 62:63-66.

Ramezani M., Hosseinzadeh H. and Samizadeh S., 2004. Antinociceptive effects of *Zataria multiflora* Boiss fractions in mice. *Journal of Ethnopharmacology*, 91(1):167-170.

Shafiee A. and Javidnia K., 1997. Composition of essential oil of *Zataria multiflora*. *Planta Medicine*. 63:371-372.

Shaiq Ali M., Saleem M., Ali Z. and Ahmad V.U., 2000. Chemistry of *Zataria multiflora* (Lamiaceae). *Phytochemistry*. 55(8):933-936.

TRC, 1984. OECD guideline for testing of chemicals. Section 2. Effects on biotic systems. pp.1-39.

The lethal concentration (LC_{50}) of *Zataria multiflora* essential oil in fries of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*)

Sharif Rohani M.^{(1)*}; Haghghi M.⁽²⁾ and Assaeian H.⁽³⁾

rohani@ifro.ir

1-Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran

2,3-Coldwater Fishes Research Center (CFRC), P.O.Box: 46815-467 Tonekabon, Iran

Received: November 2010

Accepted: July 2011

Keywords: Medicinal plants, Rainbow trout, Toxicity, Iran

Abstract

This research was carried out to determine LC_{50} for *Zataria multiflora* essential oil in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fries at 96 hours. In the process, we used the static O.E.C.D method for 180 rainbow trout fries weighing 5 ± 1 grams in five treatments and one control with three replicates. During the experiments, the mean ($\pm SD$) of water temperature was kept at 16 ± 1 °C, dissolved oxygen (DO) was 7 ± 0.2 mg/l and pH was 8 ± 0.4 . We used 5-25 ppm of the essential oil and the results were analyzed using probit analysis procedure. The LC_{50} 96h of *Zataria multiflora* essential oil was determined as 13.6 ppm for rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fry. Based on the results, the useful maximum concentration of *Zataria multiflora* essential oil was less than 10 ppm in rainbow trout fry. The results indicated a narrow therapeutic index for *Zataria multiflora* essential oil.

*Corresponding author