

بررسی پراکنش مکانی و زمانی رده تالیسه (Thaliacea:Urochordata) در آبهای پیرامون جزیره هرمز، ایران

مهدیه افتخار^{(۱)*}; احمد سواری^(۲); حمید رضایی^(۳); علیرضا مهوری^(۴) و روح الله زارع^(۵)

Eftekhari_mah@yahoo.com

۱- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: ۶۶۹

۲- موسسه ملی اقیانوس شناسی، تهران صندوق پستی: ۴۶۵۱۵-۳۶۹

۳- مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی عمان و خلیج فارس، جزیره هرمز

۴- دانشگاه دریانوری و علوم دریایی چابهار

۵- تاریخ پذیرش: فروردین ۱۳۸۸

تاریخ پذیرش: بهمن ۱۳۸۹

تاریخ دریافت: فروردین ۱۳۸۸

لغات کلیدی: تالیسه، غلافداران، پلانکتون دائمی، دوره تولید مثلی، جزیره هرمز

آبزیان باشد، بعنوان مثال تجمع *Salpa fusiformis* در جریان کالیفرنیا که منطقه‌ای بسیار وسیع را به مدت چهار ماه اشغال کرده بود، باعث مهاجرت ماهیان این منطقه شد (Berner, 1967). بنابراین مطالعه غلافداران پلازیک از هر نظر حائز اهمیت می‌باشد. غلافداران پلازیک در همه اقیانوسها پراکنش وسیعی دارند، اما ترکیب گونه‌ای و فراوانی آنها در مناطق مختلف دریاها متفاوت است. در دریاهای مناطق حاره، تالیسه‌ها شامل: *Salpa*, *Doliolum* و *Pyrosoma* اعضای غالب جوامع پلانکتونی می‌باشند.

جزیره هرمز در دهانه تنگه هرمز، در مدخل ورودی خلیج فارس از دریای عمان واقع شده است. این جزیره را بعلت موقعیت جغرافیایی آن که در مجاورت با تنگه هرمز قرار دارد، کلید خلیج فارس می‌دانند. این جزیره از شمال غرب به بندر عباس و جنوب به جزایر قشم و لارک محدود می‌شود. فاصله جزیره هرمز تا جزایر اطراف و تا بندر عباس حدود ۱۸ کیلومتر است (بختیاری، ۱۳۶۹). جزیره هرمز به بدليل موقعیت جغرافیایی خاص خود و واقع شدن در محل ورودی آب دریای عمان به خلیج فارس برای این تحقیق انتخاب گردید. بدليل

غلافداران گروهی از طنابداران پست هستند که بعنوان دم طنابداران (Urochordata) شناخته شده و متعلق به شاخه طنابداران (Chordata) هستند. زیر شاخه غلافداران دارای سه رده به نامهای لا رواسه (Larvacea)، اسیدیاسه (Ascidiae) و تالیسه (Thaliacea) می‌باشد (Zheng, 1989). رده تالیسه شامل سه راسته *Cyclomyaria*, *Pyrosomatida* و *Salpida* (Desmomyaria) است که همگی دریایی، پلانکتون دائمی (Holoplanktonic) و ریزه‌خوار هستند. تغذیه آنها به روش فیلتر کردن آب دریا از منافذ بدنشان است. غلافداران ژلاتینی می‌توانند بعنوان شاخص توده‌ها و جریانات آبی باشند (Caron et al., 1989; Davoll & Silver, 1986; Alldredge & Silver, 1988; Steinberg et al., 1994; Davoll & Youngbluth, 1990) بعنوان مثال گزارش شده که ماهی حلوای سیاه (*Parastromateus niger*) از غلافداران تغذیه می‌کند. از این جهت پراکنش غلافداران می‌تواند بعنوان شاخصی برای تشخیص مناطق حضور این ماهی در منطقه هندو آرام که محدوده پراکنش این ماهی است، باشد. حضور بعضی از گونه‌های غلافدار می‌تواند عاملی در مهاجرت

*نویسنده مسئول

تصورت مورب و از حدود ۵/۰ متری نزدیک بستر تا سطح آب انجام شود. مدت زمان هر تور کشی ۱۰ دقیقه بود (این مدت زمان بصورت تجربی طی اولین دوره نمونهبرداری تعیین گردید). در بهمن ماه بدلیل خرابی هوا و از دست دادن تور حین نمونهبرداری، نمونهبرداری از بعضی ایستگاهها صورت نگرفت. برای شمارش و شناسایی، ابتدا غلافداران از سایر نمونههای رئوپلانکتون جداسازی گردید. برای جداسازی و شمارش از لام بوگرو به حجم ۱۰ میلی لیتر استفاده شد. با توجه به مشخصات مورفولوژیکی، نمونهها تیپبندی شده و با استفاده از کلیدهای شناسایی و مشخصات جزئی تر تا پایین ترین سطوح ممکن شناسایی نمونهها انجام شد. از آنجایی که در سالهای اخیر گونه جدیدی از غلافداران شناسایی نگردیده است، لذا کلیدهای شناسایی معتبر و موجود همان کلیدهای مربوط به گشتها و بررسی های گذشته می باشد که از معتبرترین آنها می توان کلید شناسایی مربوط به رده لاروسه (Fenaux, 1993) و کلید شناسایی مربوط به تالیسه (Godeaux, 1990) را نام برد.


در این مطالعه ارتباط میان فراوانی گونهها در دورهها و ایستگاههای مختلف از طریق آزمون آنالیز واریانس دو طرفه بررسی گردید. جهت بررسی ارتباط میان فراوانی گونههای مختلف از آزمون همبستگی استفاده گردید. کلیه آزمون های ذکر شده فوق با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS نسخه ۱۱/۵ انجام شد. آزمون Similarity و آنالیز خوشای مربوط به شباهت فراوانی گونههای مختلف در دوره مطالعه توسط برنامه آماری PRIMER ترسیم شد.

در این تحقیق چهار گونه، متعلق به دو راسته و دو خانواده شناسایی گردید. گونههای شناسایی شده عبارتند از: گونه *Thalia democratica*, *Doliolum nationalis*, *Doliolum denticulatum* و *Salpa cylindrica*. علاوه بر این یک مرحله از تولید مثل غیر جنسی راسته دولیولیدها تحت عنوان Old nurse نیز شناسایی و شمارش گردید. مقایسه میانگین تعداد گونههای تالیسه طی دوره مطالعه بیشترین تراکم را مربوط به گونه *T. democratica* و در خرداد ماه و در ایستگاه دور از ساحل جنوبی نشان می دهد (نمودار ۱ و ۲).

همین موقعیت جغرافیایی بر خلاف وجود تفاوتها در تراکم، پراکنش، تنوع و سایر متغیرهای مکانی و زمانی، گونههای هر دو منطقه دریایی عمان و خلیج فارس در این ناحیه یافت می شوند. تاکنون اغلب مطالعات صورت پذیرفته در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بصورت کلی و در زمینه تمامی گروههای رئوپلانکتونی بوده است و اطلاعات بسیار اندک و قدیمی در زمینه گونههای غلافداران پلاژیک در آبهای خلیج فارس وجود دارد. در سال ۱۹۷۷ طی گشت آمریکایی آتلانتیس II گونه *Doliolum nationalis* که یک گونه نرتیک است، شناسایی گردید. همچنین گونه *Doliolum denticulatum* گونه غالب در خلیج فارس و دریای عمان اعلام شد. (Gibson, 1980). دو گونه از سالپ ها با نامهای علمی *Thalia democratica* و *Salpa cylindrica* توسط Godeaux شناسایی گردیدند. در بررسی دیگری از منطقه خلیج فارس و دریای عمان، پنج گونه از *Doliolid* که دارای پراکنش جهانی هستند شناسایی شدند (Godeaux, 1993).

از آنجایی که تاکنون مطالعات دقیقی از پراکنش و فراوانی رده تالیسه در آبهای خلیج فارس بویژه سواحل ایرانی انجام نشده است، نتایج تحقیق حاضر می تواند حائز اهمیت باشد. هدف از این بررسی شناسایی گونههای رده تالیسه در آبهای پیرامون جزیره هرمز و مطالعه پراکنش مکانی و زمانی این رده و تعیین عوامل موثر بر پراکنش آنها می باشد. این بررسی در آبهای پیرامون جزیره هرمز انجام شد. نمونهبرداری از مرداد ماه ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۸۷ از چهار ترانسکت واقع در چهار جهت اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب جزیره هرمز صورت گرفت. در هر ترانسکت دو ایستگاه یکی نزدیک به ساحل با فاصله تقریبی ۵۰۰ متری و دیگری ایستگاه دور از ساحل با فاصله حدود ۱/۵ کیلومتری از ساحل انتخاب گردید (شکل ۱).


نمونهبرداری بصورت مورب از نزدیک بستر (با فاصله نیم متری از بستر) تا سطح آب، با تور پلانکتونی ۳۰۰ میکرون انجام شد. این نمونهبرداری هر چهل روز یکبار (از مرداد ماه ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۸۷) تکرار گردید. در هنگام نمونهبرداری به انتهای تور توسط طناب یک وزنه ۵ کیلوگرمی وصل شد که باعث پایین ماندن تور در زیر آب گردد و سعی بر آن شد که تور کشی




شکل ۱: جزیره هرمز و موقعیت ایستگاههای در آن

است. همざمان با مطالعه افراد غلافداران پلازیک، تعدادی فرد Old nurse (یکی از مراحل اولیه زندگی تالیسه) مورد شناسایی قرار گرفت. بیشترین تراکم در مهر ماه 0.45 ± 0.28 ، تعداد در متارمکعب) و کمترین تراکم در اسفند ماه 0.03 ± 0.03 تعداد در متارمکعب) مشاهده شد. میانگین تراکم در گونه‌های مختلف در نمودار ۳ نشان داده شده است.




کمترین میانگین ($\pm SD$) تراکم گونه *D. denticulatum* در اسفند ماه 0.07 ± 0.11 تعداد در متارمکعب) و بیشترین میانگین ($\pm SD$) تراکم آن در مهر ماه 0.19 ± 0.52 تعداد در متارمکعب) مشاهده گردید. این گونه در ماههای دی و بهمن حضور نداشت. کمترین میانگین ($\pm SD$) تراکم گونه *D. nationalis* در ماه مرداد 0.04 ± 0.04 تعداد در متارمکعب) و بیشترین میانگین ($\pm SD$) تراکم این گونه در مهر ماه 0.21 ± 0.36 تعداد در متارمکعب) مشاهده شده



نمودار ۱: میانگین تعداد گونه‌های تالیسه در ایستگاههای مختلف



نمودار ۲: میانگین تعداد گونه‌های تالیسه در ماههای مختلف




نمودار ۳: میانگین تراکم گونه‌ها در ماههای مختلف مطالعه


فراوانی *Doliolum denticulatum* با فراوانی گونه *Thalia democratica* نشان می‌دهد ($P < 0.01$). نتایج نمودار آنالیز خوشای میان فراوانی گونه‌ها نشان می‌دهد که فراوانی گونه *Doliolum denticulatum* با یکدیگر دارای نزدیکترین ارتباط هستند (شکل ۳).

بیشتر گونه‌های *Doliolid* ساکن آبهای گرم هستند، بنابراین نواحی گرمسیری دارای بالاترین تنوع گونه‌ای *Doliolid* می‌باشد (*D. denticulatum*, Esnal & Daponte, 1999). محدوده پراکنش (Kott, 2005) هند و آرام، اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه می‌باشد در تحقیق حاضر گونه *D. denticulatum* در بیشتر ماهها حضور و غالیت داشت این گونه در بررسی‌های قبلی صورت گرفته در آبهای خلیج فارس و دریای عمان همراه با گونه *Salpa cylindrica* بعنوان گونه‌های غالب معرفی شدند (Godeaux, 1988).

کمترین فراوانی گونه *Thalia democratica* در اردیبهشت ماه با (۴۱/۰ تعداد در مترمکعب) و بیشترین فراوانی در خرداد ماه با (۵۹۱ تعداد در مترمکعب) مشاهده شد. با این تفاوت که نمونه‌های مشاهده شده در اردیبهشت ماه بیشتر از نوع تکری و نمونه‌های مشاهده شده در خرداد ماه همگی نمونه‌هایی جدا شده از فرم کلونی بودند (شکل ۲ a,b). این امر نشان‌دهنده بخشی از چرخه تولید مثلی این گونه می‌باشد. گونه *Salpa cylindrica* در طول دوره بررسی گونه تنها در ایستگاه دور از ساحل جنوبی و در دی ماه مشاهده گردید. در طول دوره مطالعه تنها یک گونه که به فرم تکزی یا اووزوئید بود مشاهده گردید و سایر مراحل جنسی مربوط به این گونه دیده نشد. نتایج آزمون همبستگی میان گونه‌ها رابطه معنی‌داری میان فراوانی گونه *Doliolum denticulatum* و *Old nurse* و همینطور میان



شکل ۲: نمایی از گونه (a) *Thalia democratica* فرم تکزی، (b) فرم کلونی



شکل ۳: نمودار آنالیز خوشای گونه‌های فراوانی تالیسه

نتایج حاصل از آنالیز خوشهای مقایسه ایستگاهها از نظر فراوانی ارتباط نزدیک میان ایستگاه شمال و غرب را نشان می‌دهد. این امر را نیز می‌توان وابسته به گردش آب در خلیج فارس دانست که از تنگه هرمز وارد شده به سمت شمال و سواحل ایرانی رفته و در آخر از مناطق جنوبی خلیج فارس خارج می‌گردد.

مقایسه تراکم گونه‌های تالیسه در ایستگاه‌های مختلف تفاوت قابل ملاحظه‌ای را در ایستگاه دور از ساحل جنوبی نشان می‌دهد. می‌توان فراوانی و تغییرات جمعیتی غلافداران را وابسته به چندین عامل دانست. عامل اول که عامل مهمی به نظر می‌رسد ورود توده‌های آبی از دریای عمان و از طریق تنگه هرمز به اطراف جزیره است. این آب حاوی مواد غذایی زیاد بوده و از دما و شوری مطلوبی برخوردار است. عامل دوم وجود خود جزیره می‌باشد که بعنوان یک پناهگاه عمل کرده و جریاناتی که به سمت این جزیره می‌آیند با برخورد به جزیره، درکل جزیره پخش می‌شوند و مواد موجود در آن نیز در همه جا توزیع شده و همین امر باعث یکنواختی در توزیع عوامل غذایی و فیزیکی می‌گردد.

منابع

- بختیاری، م.، ۱۳۶۹.** راهنمای مفصل ایران (ج ۲۲)، استان هرمزگان، انتشارات سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، ۳۱۵ صفحه.
- Alldredge A. and Silver M.W., 1988.** Characteristics, dynamics and significance of marine snow. *Progress in Oceanography*, 20:41-82.
- Berner L.D., 1967.** Distribution atlas of Thaliacea in the California current region. California Cooperative Oceanic Fisheries Investigation Atlas, 8:1-322.
- Caron, D.A., Madin L.P. and Cole J.J., 1989.** Composition and degradation of salp fecal pellets: Implication for vertical flux in oceanic environments. *Journal of Marine Research*, 47:829-850.

همانطور که ذکر گردید گونه *Salpa cylindrica* در بررسی حاضر تنها در یک ایستگاه و در دی ماه شناسایی شد. احتمالاً اختلاف در ترکیب و فراوانی گونه‌های گزارش شده در مطالعات مختلف به تغییرات جریانات آبی منطقه، محل و نحوه نمونه‌برداری و مهمتر از آن سایز چشمی تور و نوع تورکشی-افقی، عمودی یا مورب-بستگی دارد. همچنین اختلافات زمانی موجود میان مطالعات عامل موثری در بروز چنین تفاوت‌هایی می‌گردد. از آنجایی که سالپها موجوداتی فرصت طلب محسوب می‌شوند، اندازه جمعیت آنها هنگامی که محیط تغذیه‌ای مناسبی وجود داشته باشد، به سرعت افزایش می‌یابد و تولید مثل آنها به *Zadlis et al., 1995*. لذا افزایش تراکم گونه *T. Democratica* در خرداد ماه می‌تواند مربوط به فراهم آمدن چنین شرایطی باشد. گونه *T. democratica* یکی از فراوانترین گونه‌های آبهای گرمسیری است. این گونه بیشتر به فرم گروهی دیده می‌شود تا فرم تکزی آن. ارتباط میان افراد در زنجیره بسیار ضعیف است و به همین دلیل بندرت می‌توان از طریق تورکشی یک زنجیره را سالم مشاهده کرد (*Wickstead & Hutchinson, 1965*). گونه *nationalis* پراکنیش آن اطلس شمالی، شمال شرقی اقیانوس آرام و دریای مدیترانه می‌باشد (*Greve et al., 2004*). مقایسه فراوانی میان دولیولومها که در بهمن ماه اغلب از نوع اووزوئید (مرحله غیرجنسی) بودند نشان می‌دهد که چرخه تولید مثل جنسی در دولیولیدها از اسفند ماه آغاز می‌گردد. در اسفند ماه کمترین فراوانی *Old nurse* را که مرحله بعد از اووزوئید می‌باشد، مشاهده شد. در خرداد ماه مشاهده *Old nurse* توأم با مشاهده مرحله گونوزوئید در گونه‌های *Doliolum* موجود بود که این امر خود نشان دهنده مرحله تولید مثل غیرجنسی در این ماهها، از اواخر اسفند ماه تا خرداد ماه می‌باشد. بدلیل دشواری در نگهداری نمونه‌های فیکس شده و تغییر شکل ساختارهای ژلاتینی شناسایی گونه‌های مربوط به این مرحله امکان‌پذیر نبود. لذا از آنجایی که تنها گونه‌های شناسایی شده در مطالعه حاضر *D. nationalis* و *D. denticulatum* می‌باشد، به احتمال بسیار زیاد مرحله تولید مثلی مذکور نیز مربوط به همین گونه‌ها بودند. نتایج آنالیز خوشهای فراوانی گونه‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً *D. denticulatum* های مشاهده شده مربوط به گونه *Old nurse* هستند.

- Davoll P.J. and Silver M.W., 1986.** Marine snow aggregates: Life history sequence and microbial community abandoned larvacean houses from Monterey Bay, California. *Marine Ecology Progress Series*, 33:111-120.
- Davoll P.J. and Youngbluth M.J., 1990.** Hetrotrophic activity on appendicularian (Tunicata: Appendicularia) house in mesopelagic region and their potential contribution to particle flux. *Deep-Sea Research*, 37:285-294.
- Esnal G.B. and Daponte M.C., 1999.** South Atlantic zooplankton, edited by D. Boltovskoy, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, pp.1409-1421.
- Fenaux R., 1993.** The classification of Appendicularia (Tunicata); history and current state. *Mémoires de l'Institut Océanographique*, Monaco, 17:1-123.
- Gibson V.R., 1980.** Zooplankton investigation in Gulf waters north and south of the strait of Hormoz, Proceeding of the Symposium on the Coastal and Marine Environment of the Red Sea- Gulf of Aden and tropical Western Indian Ocean, Khartoum, 9-14 Jan., 2:501-517.
- Godeaux J., 1988.** Thaliacés récoltés en mer d'Arabie,dans le golfe Persique et dans le golfe d'Aden par le «N.O. commandant Robert Giraud», Bull. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer, Bruxelles, 34(2):301-324.
- Godeaux J., 1990.** Urochordata-Thaliacea. In: Reproductive biology of invertebrates (K.G. Adiyodi and R.G. Adiyodi, eds), Oxford and I.B.H. Publishing, New Dehli, India. IVB:453-469.
- Godeaux J.,1993.** The State of the Art of Plankton Research in two Hyperhaline Bodies of Water, the Levantine Basin and the Arabian Gulf. *Progress in Belgian Oceanographic Research*, pp.263-272.
- Greve W., Reiners F., Nast J. and Hoffmann S., 2004.** Helgoland roads meso- and macrozooplankton time-series 1974 to 2004: Lessons from 30 years of single spot, high frequency sampling at the only off-shore island of the North Sea. *Helgoland Marine Research*, 58:274-288.
- Kott P., 2005.** Catalogue of Tunicata in Australian waters. Queensland Museum, Brisbane, Australia Department of the Environment and Heritage. <http://www.sealifebase.org>.
- Steinberg K.D., Silver M.W., Pilskalm H.C., Coale L.S. and Paduan B.J., 1994.** Midwater communities on pelagic detritus (giant larvacean houses) in Monterey Bay, California, *Limnology and Oceanography*, 39:1606-1620.
- Wicksteed J.H. and Hutchinson , 1965.** An introduction to the study of tropical plankton. Hutchinson and Co (publisher) LTD, first published.
- Zedlis J.R., Davis C.S., James M.R., Ballara S.L., Booth W.E. and Chang F.H., 1995.** Salp grazing: Effect on phytoplankton abundance, vertical distribution and taxonomic composition in a coastal habitat, *Marine Ecology Progress Series*, 126:267-283.
- Zheng Z., 1989.** Marine planktonology. China Ocean Press Beijing, Springer-Verlag, Berlin, Heidelbery, New York, Tokyo. pp.385-399.

Temporal and spatial distribution of Thaliacea of the Urochordata around Hormuz Island, the Persian Gulf

Eftekhari M.^{(1)*}; Savari A.⁽²⁾; Rezaei H.⁽³⁾; Mahoori A.R.⁽⁴⁾ and Zare R.⁽⁵⁾

Eftekhari_mah@yahoo.com

1,2- Marine Sciences and Technology of Khoramshahr University, P.O.Box: 669 Khoramshahr, Iran

3- Iranian National Institute of Oceanography (INCO) P.O.Box: 14118-13389 Tehran, Iran

4- Persian Gulf and Oman Sea Marine Environmental Research Centre, Hormuz Island, Iran

5- Navigation and Marine Sciences of Chahbahar University, Daneshgah Ave., Chahbahar, Iran

Received: April 2009

Accepted: February 2011

Keywords: Thaliacea, Tunicates, Holoplankton, Life cycle, Hormuz Island

Abstract

The class Thaliacea belongs to Urochordata which branched from phylum chordata. Thaliacea have three orders: Doliolida (Cyclomyaria), Pyrosomatida and Salpida (Desmomyaria) and all are considered marine plankton, holoplankton and microphages. These animals feed by filtering water through their body. The aim of this research was to identify and study the ecological processes of the tunicates in coastal waters of the Hormuz Island in the Persian Gulf. We sampled water in an annual basis, starting from July 2007 and terminating in May 2008. Periodic sampling (Every 40 days) was applied and the use of plankton net with mesh size 300 μ m made it possible to collect plankton samples from four localities (south, north, east, west) of the Island each having two stations, one in the vicinity of the coastal waters and another away at about 2.5 miles. We found 4 species of Thaliacea: *Doliolum denticulatum*, *Doliolum nationalis*, *Thalia democratica*, *Salpa cylindrica*. In addition, we observed a life stage of *Doliolum*. The highest frequency was observed in May and in the south station. There was significant correlation between abundance of *Doliolum denticulatum* and its late oozoid or old nurse; and between *Thalia democratica* and *Doliolum denticulatum*.

*Corresponding author