

مقایسه همبستگی طول و وزن با تراکم جیوه در اندامهای مختلف ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی

رقیه فروغی*؛ عباس اسماعیلی ساری و سید محمود قاسمپوری

Somayeh_13812001@yahoo.com

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس،

نور صندوق پستی: ۱۴۱۱۵-۳۵۶

تاریخ پذیرش: شهریور ۱۳۸۵

تاریخ دریافت: خرداد ۱۳۸۵

چکیده

به منظور بررسی همبستگی طولی و وزنی ماهی سفید با تجمع مقادیر جیوه مطالعه‌ای صورت گرفت که با استفاده از دستگاه Mercury Analyzer مدل Leco AMA ۲۵۴ انجام شد. ماهی سفید از سواحل مرکزی خزر جنوبی در فاصله مهر ماه تا آذر ماه ۱۳۸۴ تهیه شد. بعد از زیست‌سنگی نمونه‌ها (اندازه گیری طول و وزن آنها) و تشخیص جنسیت، غلظت جیوه در عضله، کبد و پوست اندازه گیری شد. متوسط غلظت جیوه در عضله، کبد و پوست بترتیب برابر با $849/4 \pm 670/9$ و $493/7 \pm 100$ نانوگرم در گرم بود. تفاوت معنی‌داری بین غلظت جیوه در این سه اندام مشاهده گردید ($P < 0.05$). هیچگونه ارتباطی بین تغییرات طول و وزن با مقادیر جیوه به اثبات نرسید. همچنین بین غلظت جیوه دو جنس نر و ماده هیچگونه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد ($P > 0.05$). غلظت جیوه در بافت عضله ماهی سفید پایین‌تر از حد استاندارد ارائه شده توسط (FDA) می‌باشد.

لغات کلیدی: جیوه، ماهی سفید، عضله، کبد، پوست

مقدمه

جانوری جذب و وارد زنجیره غذایی شوند. مตیل جیوه در طول زنجیره غذایی افزایش می‌یابد. کرمها و حشرات بستری جیوه آلی را در بدن جذب و تغییل می‌کنند. فرآیند تغییل و تجمع که تحت عنوان تجمع زیستی یا بزرگنمایی زیستی شناخته شده است، همچنان در ماهیان بزرگتری که از ماهیان کوچکتر تغذیه می‌کنند تا آخرین ماهی شکارگر ادامه می‌یابد (اسماعیلی ساری، ۱۳۸۱).

از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد متیل جیوه در موجودات آبی تجمع می‌یابد، مهمترین منبع در معرض قرار گرفتن انسان نسبت به

تأثیر جیوه بر سلامتی برخی افراد (از طریق تعاس شغلی یا کاربرد درمانی آن) سالهای است که شناخته شده است اما توجه به جیوه بعنوان یک آلاینده محیطی موضوعی جدید بشمار می‌آید (سبزواری، ۱۳۸۰). جیوه دارای اثرات منفی زیادی روی سیستم تولید مثل، تنفس و دستگاه ایمنی می‌باشد (Jones & Slotton, 1996).

نمکهای جیوه عنصری و غیرآلی می‌توانند توسط باکتری‌های موجود در گل و لای بستر آبهای آلوده به متیل جیوه تغییر شکل داده و از طریق گیاهان آبزی، جلبکها، ماهی‌ها و اشکال پست

* نویسنده مسئول

پتری دیش قرار داده شدند و بعد از آن پتری دیش به آون منتقل گردید و نمونه‌ها در دمای ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۸ ساعت قرار داده شدند. نمونه‌ها پس از خشک شدن توسط هاون چینی پودر شده و داخل ظروف پلی اتیلن ریخته شد. از هر نمونه به میزان ۰/۰۳ تا ۰/۰۵ گرم با ترازوی الکترونیکی توزین و جهت آنالیز به دستگاه AMA داده شد. زمان لازم برای هر آنالیز برابر ۳۰۵ ثانیه تعريف شد. برای انجام آنالیز آماری داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. در این تحقیق از آزمونهای one-sample t-test، همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و t غیر جفتی استفاده شد. برای مقایسه غلظت جیوه در عضله ماهی سفید با میزان استاندارد جهانی ابتدا آزمون نرمالیتی Shapiro-wilk انجام شد. سپس از آزمون one-sample استفاده گردید. برای مقایسه و بررسی وجود اختلاف معنی‌دار بین غلظت جیوه سه بافت مورد نظر، ابتدا از آزمون نرمالیتی Shapiro-wilk استفاده شد. در ابتدا چنین مقایسه‌ای به صورت کلی انجام شد. در این مقایسه داده‌ها به شدت غیرنرمال بودند که با گرفتن لگاریتم نرمال شدند و در نهایت این نتیجه بدست آمد که غلظت جیوه در عضله بیش از کبد و در کبد بیش از پوست می‌باشد.

نتایج

طبق نتایج مشخص شد که غلظت جیوه در عضله ماهی سفید پایین‌تر از میزان استاندارد ارائه شده توسط FDA می‌باشد. ابتدا داده‌ها بوسیله آزمون نرمالیتی Shapiro-wilk مورد آزمون قرار گرفت و پس از آن مشخص شد داده‌ها همگی نرمال و همگن هستند. برای مقایسه غلظت جیوه در سه اندام بین سه گروه وزنی پس از آن که مشخص شد داده‌ها غیرنرمال هستند، با گرفتن لگاریتم داده‌های گروههای وزنی نرمال شده و در مورد گروههای طولی از ریشه چهارم داده‌ها جهت نرمال کردن آن استفاده شد. سپس از آزمون ANOVA استفاده شد که نتایج این آزمون به صورت زیر گزارش شد:

- در گروه وزنی کمتر از ۵۰۰ گرم، غلظت جیوه در عضله بیشتر از کبد و در کبد بیشتر از پوست بود ($P > 0/05$) که نشاندهنده عدم تفاوت معنی‌دار بین غلظت جیوه در سه بافت است.

- در گروه وزنی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم روند غلظت جیوه همانند گروه وزنی اول بود ($P < 0/05$) که

متیل جیوه، مصرف ماهی است (Santos *et al.*, 2000) موجودات دریابی و از بین آنها ماهی، آلاینده‌ها را از محیط در خود جمع کرده و بنابراین شدیداً در برنامه‌های پایش آلودگی دریابی مورد استفاده قرار می‌گیرد (Henry *et al.*, 2004). ماهی سفید از ماهیان مهاجر به رودخانه بوده و دارای دو شکل. مهاجرین بهاره و پاییزه می‌باشد (سرینا و همکاران، ۱۳۷۸). در زمان بلوغ غذای آنها نرمنتان است و در فصل مهاجرت تغذیه نمی‌کنند. در دوران لاروی از فیتوپلانکتونها و بعد از مرحله لاروی از لارو حشرات آبزی، نرمنتان، سختپستان، رئوپلانکتونها و لارو شیرونومیده و کرم پرتار تغذیه می‌کنند (عبدی، ۱۳۷۸). محیط رشد و زندگی و نوع تغذیه ماهی سفید باعث تجمع عناصر سنگین در بافتها و اندامهای مختلف آن می‌گردد که این نه تنها بر سلامتی ماهی بلکه بر سلامتی انسان بعنوان عمدۀ ترین مصرف‌کننده ماهی موثر می‌باشد. از این‌رو اندازه‌گیری میزان جیوه در ماهی سفید دریای خزر Kutum (*Rutilus frisii kutum*) صورت گرفت و روند تجمع این عنصر در اندامهای مختلف آن شامل عضله، کبد و پوست مطالعه و همبستگی بین تجمع جیوه با طول و وزن ماهی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش کار

جهت انجام این تحقیق ماهی سفید پاییزه سواحل مرکزی خزر جنوبی (از سواحل فریدون‌کنار تا نوشهر) بعنوان جامعه آماری انتخاب گردید و برداشت از این منطقه انجام شد. تعداد ماهیان نمونه‌برداری شده ۴۶ عدد بود که با استفاده از صید پره از صیدگاههای مرکزی مازندران تهیه گردید.

پس از تهیه ۴۶ عدد ماهی در سه اندازه مختلف وزنی و طولی و در دو جنس نر و ماده (اندازه‌های وزنی: $500 < 500 - 1000 < 1000 < 5000$ گرم و اندازه‌های طولی: $30 - 40 < 40 - 50 < 50 - 60$ سانتیمتر در مجموع ۶ گروه ماهی سفید، از هر گروه به تعداد ۵ تا ۱۲ نمونه) گروه‌بندی شدند. عملیات زیست‌سنجی شامل اندازه‌گیری طول و وزن ماهی انجام شد. سپس نمونه‌ها کدبندی شده و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. نمونه‌های مورد استفاده در این تحقیق همگی نمونه‌های بالغ بودند که جنسیت آنها براساس وجود لکه‌های سفید رنگ بر روی سر ماهیان نر و عدم وجود این لکه‌ها در ماهیان ماده تشخیص داده شد. سپس بافت‌های عضله، کبد و پوست جداسازی شده و در

- در گروه طولی ۵۰ تا ۶۰، نیز نتایجی دقیقاً مشابه گروه طولی دوم مشاهده گردید.

در نهایت برای مقایسه وجود تفاوت معنی‌دار در بین جنسهای نر و ماده از آزمون t غیرجفتی استفاده گردید. در ابتدا داده‌ها نرمال نبودند که با گرفتن لگاریتم نرمال شده و مشخص شد که در باقتهای مورد مطالعه هیچگونه تفاوت معنی‌داری بین غلظت جیوه جنسهای نر و ماده مشاهده نمی‌شود (در هر سه مورد $P > 0.05$).

جدول ۱ غلظت جیوه را در باقتهای مختلف ماهی به تفکیک گروههای وزنی ارائه می‌دهد. نمودار ۱ مقایسه غلظت را در باقتهای مختلف ماهی نشان می‌دهد و در نمودار ۲ غلظت جیوه بین نر و ماده در سه بافت مقایسه شده‌اند.

نشاندهنده وجود تفاوت معنی‌دار در سطح ۹۵ درصد است.

- در گروه وزنی بیش از ۱۰۰۰ گرم همان روند بالا در غلظت ($P < 0.05$) و تفاوت معنی‌دار در سطح ۹۹ درصد دیده شد.


- در گروه طولی ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر روند غلظت جیوه به صورت زیر مشاهده شد:

عضله > کبد > پوست ($P < 0.05$) که نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین غلظت جیوه در سه بافت بود.

- در گروه طولی ۴۰ تا ۵۰ همان روند فوق در مورد غلظت جیوه ($P < 0.05$) مشاهده شد که بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار در سطح ۹۵ درصد بود.


جدول ۱: میانگین غلظت جیوه بر حسب نانوگرم در باقتهای مورد مطالعه ماهی سفید به تفکیک گروههای وزنی (گرم)

میانگین غلظت جیوه در نر	میانگین غلظت جیوه در ماده	میانگین غلظت جیوه در نر	میانگین غلظت جیوه در ماده	میانگین غلظت جیوه در نر	میانگین غلظت جیوه در ماده	میانگین غلظت جیوه در نر	میانگین غلظت جیوه در ماده
$1000 >$	$1000 >$	500	$500 - 1000$	$500 <$	$500 <$	$500 <$	$500 <$
۳۶۷/۹	۲۲۴/۲	۵۲۲/۳	۶۰۶/۹	۴۸۸/۶	۶۳۴/۸	پوست	
۴۴۹/۹	۵۰۹/۱	۷۶۷/۳	۸۰۱/۹	۵۹۵/۳	۷۳۱/۲	کبد	
۵۵۲/۹	۸۰۱/۳	۹۶۷/۲	۹۸۶/۷	۶۰۸/۸	۹۹۱/۱	عضله	



نمودار ۱: مقایسه غلظت جیوه در عضله و کبد و پوست ماهی سفید

میانگین‌هایی که حروف کناری آنها شبیه هم یا حداقل دارای یک حرف مشترک هستند فاقد اختلاف معنی‌دارند و آنهایی که فاقد حروف مشترک هستند دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند.



نمودار ۲: مقایسه غلظت جیوه در عضله و کبد و پوست در جنسهای نر و ماده ماهی سفید

ns. عدم وجود تفاوت معنی دار در سطح ۹۵ درصد

بحث

در غیر این صورت خیر. با افزایش سن و رشد ماهی فلزات دارای یک اثر رقیقی بوده و یونهای فلزات از طریق فلسفهای ماهی با آب تبادل دارند که می‌تواند بعنوان دلایل این نتیجه ذکر گردد. در تحقیق حاضر غلظت جیوه در بافت‌های مورد بررسی **بترتیب عضله > کبد > پوست افزایش می‌یافتد.** در مورد گروههای طولی و وزنی در هر سه گروه طولی و وزنی چنین رابطه‌ای مشاهده گردید. تفاوت بین غلظت جیوه در این سه اندام به جز در مورد گروه طولی و وزنی اول در دو گروه طولی و وزنی معنی دار بود.

Goldstein و همکاران در سال ۱۹۹۵، در آنالیز غلظت جیوه در کبد و عضله کپور و گربه ماهی مشاهده کردند که غلظت جیوه در بافت عضله حدود دو برابر کبد می‌باشد. نتیجه این تحقیق روی بافت‌های مختلف نشان داد که غلظت جیوه در کپور به این صورت **عضله > کل بدن > کبد** می‌باشد. **Alti** و **Canli** در ۲۰۰۳ مطالعه‌ای انجام دادند که مشخص گردید غلظت فلزات بر حسب نانوگرم در گرم وزن خشک در کبد بالاترین بود به جز در مورد آهن که در آبشش *Scomberesox saurus* بالاترین میزان را داشت و در همه گونه‌های ماهی کمترین میزان فلزات در عضله مشاهده گردید. علت این مسئله، متابولیسم متفاوت فلزات در بافت‌های مختلف ذکر شد که نقش مهمی در تجمع فلزات در اندامها دارد. در تحقیق حاضر در مقایسه غلظت جیوه در دو جنس نر و ماده هیچگونه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

Farkas و همکاران نیز در سال ۲۰۰۳ در مطالعه خود مشخص کردند که برای بررسی الگوی وابسته به سن و اندازه با غلظت فلزات سنگین در اندامهای *Abramis brama* هیچ

در این تحقیق نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌های عضله نشان داد که میانگین غلظت جیوه در این اندام $849/4$ نانوگرم در گرم بود که این آلدگی پایین‌تر از حد استاندارد FDA می‌باشد.

Mirlean و همکاران در سال ۲۰۰۵ مقدار جیوه را در سه دریاچه در برزیل جنوبی اندازه‌گیری کردند و رابطه بین جیوه آب دریاچه و بافت ماهی را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق مشخص شد که متوسط غلظت جیوه در گیاه‌خواران 52 نانوگرم در گرم، در همه چیزخواران / دتریت‌خواران 91 نانوگرم در گرم و در ماهیخواران 370 نانوگرم در گرم و اغلب بالاتر از استاندارد WHO بود.

در تحقیق انجام شده حاضر به جز در پوست که یک همبستگی منفی معنی دار بین غلظت جیوه و وزن و طول ماهی مشاهده شد، هیچ گونه همبستگی معنی داری بین غلظت جیوه و وزن و طول ماهی در عضله و کبد ماهی سفید مشاهده نگردید.

Alonso و همکاران نیز در سال ۲۰۰۰، هیچگونه رابطه‌ای بین غلظت جیوه و وزن و طول ماهی در خلیج صنعتی ساحل کلمبیا مشاهده نکردند که دلایل آن بشرح زیر بیان شده است:

۱- تعداد کم نمونه ماهی ($n=7$)

۲- تفاوت در دسترسی به جیوه

۳- توزیع طولها به صورت همنگ

در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۱، غلظت فلزات سنگین **Rashed** را در بافت‌های مختلف *Tilapia nilotica* اندازه‌گیری کرد که مشخص شد با افزایش سن، غلظت روی در این گونه کاهش می‌یابد. علت این مسئله بدین صورت ذکر گردید که اگر میزان جذب عناصر از طریق غذا و آب برای میزان انتشار آنها به خارج از بدن ماهی باشد، میزان عناصر با افزایش سن ثابت می‌ماند و

- in the organs of freshwater fish *Abramis brama* L. populating a low contaminated site. Water Research. Vol. 37, pp.959-964.
- Goldstein, R.M. ; Brigham, M.E. and Stauffer, J.C. , 1995.** Comparison of mercury concentrations in liver, muscle, whole bodies, and composites of fish from the Red River of the North U.S. Geological Survey, Water Resources Division. Vol 53, pp.244-252.
- Henry, F. ; Amara, R. ; Courcet, L. ; Lacouture, D. and Bertho, M.L. , 2004.** Heavy metals in four fish species from the French coast of the Eastern English Channel and Southern Bight of the North Sea. Environmental International. Vol, 30, pp.675-683.
- Jones, A.B. and Slotton, D.G. , 1996.** Mercury effects, sources, and control measures. San Francisco Estuary Regional Monitoring Program.
- Mirlean, N. ; Larned, S.T. ; Nikora, V. and Kutter, V.T. , 2005.** Mercury in lakes and lake fishes on a conservation industry gradient in Brazil. Chemosphere. Vol, 60, pp.226-236.
- Rashed, M.N. , 2001.** Monitoring of environmental heavy metals in fish from Nasser Lake. Environmental International. Vol, 27, pp.27-33.
- Santos, L.S.N. ; Muller, R.C.S. ; Sarkis, J.E.S. ; Alves, C.N. ; Barbo, E.S. ; Santos, E.O. and Bentes, M.H.S. , 2000.** Evaluation of total mercury concentrations in fish consumed in the municipality of Itaituba, Tapajos River Basin, Para, Brazil. The Science of the Total Environment. Vol. 261, pp.1-8.
- تفاوتی از لحاظ جنسی بین غلظت جیوه در این گونه مشاهده نشد.
- با توجه به بحث و نتایج موجود در این تحقیق می‌توان بیان کرد که بین غلظت جیوه موجود در عضله، کبد و پوست ماهی سفید دریای خزر با طول، وزن و جنس این ماهی هیچگونه رابطه معنی‌داری وجود نداشته و تنها یک همبستگی منفی معنی‌دار بین غلظت جیوه موجود در پوست با طول و وزن دیده می‌شود و همچنین میانگین غلظت جیوه در بافت خوراکی ماهی سفید پایین‌تر از حد استاندارد FDA است که از نظر مصرف خوراکی ممنوعیتی وجود ندارد.

منابع

- اسماعیلی ساری، ع. ، ۱۳۸۱. آلاینده‌ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست. انتشارات نقش مهر، تهران، ۷۶۷ صفحه.
- سبزواری، ف. ، ۱۳۸۰. اثرات جیوه بر سلامتی انسان و محیط زیست. سمینار کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس. ۳۰ صفحه.
- سرپناه، ع. : طالبی حقیقی، د. : عباسی، ک. : نظامی بلوجی، ش. و ولی‌بور، ع. ، ۱۳۷۸. اطلس ماهیان ایران (آبهای داخلی گیلان). مرکز تحقیقات شیلاتی گیلان، ۱۱۳ صفحه.
- عبدلی، الف. ، ۱۳۷۸. ماهیان آبهای داخلی ایران. انتشارات نقش مانا، ۳۷۷ صفحه.
- Alonso, D. ; Pineda, P. ; Olivero, J. ; Gonzalz, H. and Compos, N. , 2000.** Mercuray levels in muscle of two fish species and sediments from the Cartagena Bay and the Cienage Grand. The Santa Marta, Colombia. Environmental Pollution. Vol. 109, pp.157-163.
- Canli, M. and Altı, G. , 2003.** The relationships between heavy metal (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) levels and the size of six Mediterranean fish species. Environmental Pollution. Vol, 121, pp.129-136.
- Farkas, A. ; Salanki, J. and Specziar, A. , 2003.** Age and size specific patterns of heavy metals

Correlation of length and weight with Mercury concentration in different tissues of Kutum Roach (*Rutilus frisii kutum*) in central south of Caspian Sea

Forooghi R.* ; Esmaeli Sari A. and Ghasempour S.M.

Somayeh_13812001@yahoo.com

Environment Group, Faculty of Natural Resource and Marine Science,
Tarbiat Modarres University, P.O.Box:14155-356 Noor, Iran

Received: June 2006

Accepted: September 2006

Keywords: Mercury, *Rutilus frisii kutum*, Caspian Sea, Iran

Abstract

We used Mercury Analyzer to assess possible correlation between length and weight of the Kutum Roach (*Rutilus frisii kutum*) and mercury accumulation in different tissues of the fish. We collected fish specimens from central south Caspian Sea from October to December 2005. After biometrical measurement of samples and sex determination, mercury concentration was assessed in muscle, liver and skin tissues of the specimens. The mean concentration of mercury in muscle, liver and skin tissues was 849.9, 670.9 and 493.7ng/g respectively. Statistical analysis of the results showed a significant difference between mercury amounts in different tissues ($P<0.05$). No significant difference was found between male and female fishes in terms of mercury concentration ($P>0.05$). The mercury amount in muscle of Kutum Roach was lower than permissible limits proposed by FDA (1000ng/g).

* Corresponding author