

مقایسه عملکرد حسگرها بر موفنول آبی و برموکروزول سبز در تعیین فساد باکتریایی و شیمیایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (*Clupeonella*) نگهداری شده در یخچال (*cultriventris caspia*)

شهاب نقدی^۱، مسعود رضائی^{*}^۱، نادر بهرامی فر^۲

^{*}rezai_ma@modares.ac.ir

- ۱- گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 ۲- گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۹۸

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۹۸

چکیده

در این پژوهش یک حسگر بر پایه فیلم زیستی کیتوزان به همراه حسگرها بر موفنول آبی و برموکروزول سبز بر پایه کاغذ صافی به منظور تعیین کیفیت میکروبی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی نگهداری شده در دمای یخچال استفاده شدند. شاخص بار باکتریایی کل (TVC) در روز صفر برابر با $\log_{10} \text{CFU}/\text{gr}$ ۳/۴۷۳ بود که در انتهای دوره نگهداری به تعداد $\log_{10} \text{CFU}/\text{gr}$ ۶/۴۹۷ تغییر کرد ($p < 0.05$). تعداد باکتری‌های سرمادوست (PTC) در ابتدای نگهداری $\log_{10} \text{CFU}/\text{gr}$ ۱/۴۷۳ بود و در طول دوره نگهداری در یخچال روند افزایشی نشان داد و سپس به مقدار $\log_{10} \text{CFU}/\text{gr}$ ۷/۵۱۶ رسید ($p < 0.05$). شاخص بازهای ازته فرار (TVB-N) در ابتدای دوره نگهداری $\text{mg N}/100\text{g}$ ۷/۰۱ بود که در انتهای نگهداری به $\text{mg N}/100\text{g}$ ۴۴/۳۴۸ افزایش یافت ($p < 0.05$). pH در طول نگهداری از ۶/۰۱۰ به ۶/۸۲۷ تغییر کرد ($p < 0.05$). میزان همبستگی بین شاخص‌های میکروبی، شیمیایی و تغییر ارزش رنگ (ΔE) متفاوت بود و بالاترین نتایج همبستگی در حسگر بر موفنول آبی مشاهده شد که همبستگی آن با شاخص‌های باکتری‌های سرمادوست، بار باکتریایی کل، کل بازهای ازته فرار و pH بترتیب ۰/۹۴۱، ۰/۹۱۲، ۰/۹۸۹ و ۰/۷۷۹ بود ($p < 0.05$). بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که همزمان با تغییرات میکروبی و شیمیایی درون بسته گوشت چرخ شده ماهی، حسگرها شروع به تغییر رنگ می‌کنند و کاهش کیفیت را به صورت تغییر رنگ نشان می‌دهند.

واژگان کلیدی: حسگر تازگی، کیتوزان، فساد باکتریایی، فساد شیمیایی، گوشت چرخ شده ماهی

*نویسنده مسئول

مقدمه

فساد باکتریایی به علت استفاده باکتری‌های عامل فساد از آسید آمینه‌های آزاد و تولید محصولات مختلف انواع آمین‌ها از تری متیل آمین و آمونیاک اتفاق می‌افتد (Listyarini *et al.*, Kuswandi *et al.*, 2012; 2017). امروزه موضوع بسته بندی محصولات غذایی به یکی از مسائل مهم دنیا تبدیل شده است. بسته بندی‌های هوشمند نوعی از بسته بندی‌های محصولات هستند که برای نمایش وضعیت درون بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌تواند کیفیت محصول را به صورت تغییر رنگ (Kuswandi *et al.*, 2015)، تغییر ولتاژ الکترود (Silvestre *et al.*, 2011) و طریق‌های مختلف به مصرف کننده بخوبی نشان دهد. در میان این بسته‌بندی‌های هوشمند دارای شناساگرها pH نوعی از بسته‌بندی‌های هوشمند هستند که کیفیت محصول را به صورت تغییر رنگ به مصرف کننده گزارش می‌دهند، این پلیمرها طبیعی مثل کیتوزان، سلولز استات، کارژینان و پلیمرهای با منشاء مختلف نیز باشند (Kuswandi *et al.*, 2012; Kuswandi *et al.*, 2015; Prietto *et al.*, 2017; Kuswandi و Zhai *et al.*, 2017) (Nurfawaidi ۲۰۱۷) از دو شناساگر pH متیل رد و برموكروزول بنفس بر پایه کاغذ صافی برای تعیین تازگی گوشت خوک استفاده کردند که عملکرد حسگرهای تغییر رنگ در صورت بروز فساد در گوشت خوک بود. در مطالعه بهمنی و همکاران (۱۳۹۵) از شناساگرها فنول قرمز و برموكروزول سبز برای تعیین تازگی فیله ماهی قزل‌آلا رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) استفاده شد که نتایج آنها نشان داد که با افزایش دوره نگهداری، شناساگرها تعیین تازگی شروع به تغییر رنگ می‌کنند. در مطالعه‌ای دیگر در داخل کشور از یک سنسور رنگ‌سنجی ساده که از آنتوسباینین استخراج شده از کلم قرمز بر پایه کاغذ صافی تشکیل شده بود، برای تشخیص فساد ماهی قزل‌آلا استفاده شد که نتایج این تحقیق نشان داد که با تغییر در روند فساد حسگر دچار تغییر رنگ شده و می‌تواند تغییر کیفیت را با تغییر رنگ نشان دهد (مجدى‌نسب و همکاران، ۱۳۹۶). کیتوزان یکی از منابع

آبزیان علاوه بر اینکه منابع غنی از مواد مغذی برای مصارف انسانی هستند، حائز ویژگی‌های خاصی از جمله، غنی از اسیدهای چرب امگا-۳-می باشند که در سایر منابع زیستی خشکی‌زی محدودتر است و نقش بسیار مهمی در سلامت و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ها ایفاء می‌کنند (Alasalvar *et al.*, 2010). در نتیجه، مصرف آبزیان و فرآورده‌های حاصل از آنها در سراسر دنیا روز به روز در حال افزایش است. با توجه به منابع محدود ماهی در دنیا و ایران استفاده از گونه‌هایی که دارای ارزش تجاری کم هستند، مورد توجه است. در این باره، ماهی کیلکا از خانواده شگ ماهیان (*Clupeidae*) از جنس *Clupeonella* است که به عنوان غالب‌ترین جنس از کیلکای آنچوی (Bordin, 1904) و *engrauliformis* (Kesler, 1877) *grimmi* می‌باشد *Clupeonella cultriventris caspia* (Ovissipour *et al.*, 2013) و کیلکای چشم درشت *Clupeonella* (Perafkandeh & Keymaram, 2011) درصد از ذخایر گونه کیلکای معمولی در دریای خزر ۴۹/۶ هزار تن برآورد شده است که شامل بیش از ۷۶ درصد از ذخایر کیلکا ماهیان می‌شود دریای خزر در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۲۵ هزار تن بوده است (سالنامه آماری شیلات ایران، ۱۳۹۵). متأسفانه به دلیل اندازه کوچک، فسادپذیری بالا و عدم تخلیه شکمی تنها بخش کوچکی به میزان ۴ درصد از کیلکا ماهیان صید شده به مصرف انسانی می‌رسد و مابقی آن برای تولید آرد ماهی استفاده می‌شود که می‌توان از آنها برای تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده مناسب از جمله گوشت چرخ شده ماهی، سوریمی و انواع مختلفی از فرآورده‌های تقلیدی استفاده کرد (Jorjani, 2014). محصولات دریایی به دلایل مختلفی از قبیل pH خنثی و محتوای پروتئینی با کیفیت بالا در معرض فساد میکروبی قرار می‌گیرند.

شد، بدین صورت که با حل کردن ۲ گرم کیتوzan در ۱۰۰ میلی لیتر استیک اسید ۰.۱٪ استفاده شد. بعد از حل شدن کامل کیتوzan در استیک اسید بر روی همزن مغناطیسی، محلول کیتوzan- شناساگر در مقادیر مشخص در پلیت‌ها توزین شده و پلیت‌ها برای مدت ۷۲ ساعت در آون ۴۵ درجه سانتی گراد نگهداری شدند (Kuswandi *et al.*, 2012). بعد از تهیه محلول شناساگرها با نسبت ۱ میلی گرم بر میلی لیتر کاغذهای صافی (کاغذ واتمن) بریده شده در محلول شناساگر به مدت کل طول شب قرار داده شد. سپس از آن خارج شده و در آون خشک شد (Kuswandi *et al.*, 2012).

شاخص‌های باکتریایی

مطابق با استاندارد ملی ایران، شماره ۸۹۲۳-۳ (۱۳۸۵) مقدار ۱ گرم از عضله پشتی هر ماهی در ۹ میلی لیتر سرم فیزیولوژی همگن شد و پس از ساخت رقت‌ها برای شمارش باکتری‌های کل و باکتری‌های سرما遁ست در نمونه‌های تهیه شده، از محیط کشت عمومی نوتریت آگار استفاده شد. برای اندازه گیری این شاخص باید نمونه‌برداری از نمونه‌ها در روزهای ۰، ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۱۶ نگهداری نمونه‌برداری از نمونه‌ها انجام شد. پس از ساخت رقت‌ها از روش پورپلیت برای کشت رقت‌های مختلف استفاده شد. تمامی تیمارها هر کدام با سه تکرار انجام شدند. بعد از کشت، باکتری‌های مزوپلیل (TVC) پلیت‌ها را پس از ۴۸ ساعت انکوباتور گذاری در دمای ۲۹ درجه سانتی گراد و باکتری‌های سرماگرا (PTC) را پس از ده روز در دمای یخچال شمارش انجام گرفت. اندازه گیری pH عضله توسط دستگاه pH سنج بافت گوشت تعیین شد (Ojagh *et al.*, 2010).

سنجهش مجموع مقادیر بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)

اندازه گیری مجموع بازهای نیتروژنی فرار به روش کجدال و با قرار دادن ۱۰ گرم نمونه به علاوه ۲ گرم اکسید منیزیم و افزودن ۵۰۰ میلی‌لیتر اتانول استفاده شد. نهایت جمع‌آوری بازهای ازته فرار در داخل محلول شامل

پلی ساکاریدی تجدیدپذیر زیستی فراوان است که از منابع مختلف همانند پوسته سخت پوستان از قبیل میگو، خرچنگ و... استحصال می‌شود که با توجه به ویژگی‌های مناسب این پلی ساکارید برای تولید انواع فیلم‌ها مناسب است که می‌توانند به عنوان پایه حسگر مورد استفاده قرار گیرند (Silvestre *et al.*, 2011; Kakaei and Shhbazi, 2016). استفاده هم‌زمان از چند شناساگر برای تعیین تازگی محصولات غذایی سبب بهبود عملکرد تشخیص مصرف کننده می‌شود و همچنین اطمینان مصرف کننده از عملکرد بسته بندی هوشمند را افزایش می‌دهد (Kuswandi & Nurfawaidi, 2017). هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول آبی و برموكروزول سبز بر پایه کاغذ صافی و برموفنول آبی بر پایه کیتوzan در تعیین فساد باکتریایی و شیمیایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی در دمای یخچال بوده است.

مواد و روش کار

ماهی کیلکا به صورت تازه و صید روز در زمستان ۱۳۹۶ از لنج گلبهار سواحل بابلسر تهیه شد و در یونولیت‌های حاوی یخ به دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهر نور مازندران منتقل شد. پس از شستشوی ماهیان با آب شیرین سرزني و دم زنی و تخلیه شکمی ماهیان انجام شد. سپس از چرخ گوشت با چشمی ۰/۵ میلی متر برای تهیه گوشت چرخ شده (مینس) استفاده شد. پس از تولید گوشت چرخ شده برای نگهداری گوشت چرخ شده در یخچال در ۴ درجه سانتی گراد مقدار ۵۰۰ گرم از گوشت چرخ شده ماهی را در ظروف یکبار مصرف حاوی حسگر قرار داده شد. شناساگر برموفنول آبی و برموكروزول سبز از شرکت دایجونگ کره جنوبی، پودر کیتوzan شرکت مرک آلمان، استیک اسید شرکت شارلو انگلستان و اتانول شرکت رازی ایران تهیه شدند. از محلول شناساگر حاوی نسبت ۱ میلی گرم شناساگر در ۱ میلی‌لیتر اتانول استفاده شد (Kuswandi *et al.*, 2012). برای تهیه فیلم از روش Kuswandi و همکاران (۲۰۱۲) با کمی اصلاح استفاده

b^* = موقعیت آن بین آبی و زرد متغیر است، مقادیر منفی a^* نشان دهنده رنگ‌های آبی و مقادیر مثبت آن به منزله رنگ‌های زرد هستند.

تجزیه تحلیل آماری

تصاویر مربوط به تغییر رنگ توسط نرم افزار فتوشاپ CS7 به دادهای Lab تبدیل شدند. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۲ انجام شد. برای مقایسه کلی پارامترها همچنین از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) و برای مقایسه میانگین داده‌ها از آزمون دانکن (در سطح ۵ درصد) سپس برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel ۲۰۱۶ استفاده شد.

نتایج و بحث

تغیيرات باكتريائي

همانطوریکه در شکل ۱ مشخص شده است، تعداد باكتري های مزو菲尔 TVC در روز صفر برابر با Log ۳/۴۷۳CFU/gr گوشت چرخ شده ماهی کیلکا بود که در طول دوره روند افزایشی داشت و بيشترین مقدار آن مربوط به انتهای دوره نگهداري با تعداد Log CFU/gr ۶/۴۹۷ بوده است ($p<0.05$). شمارش باكتري های سرمادوست نشان داد که در روز صفر تعداد بار باكتريابي سرمادوست PTC با Log CFU/ gr ۱/۴۷۳ برابر با چرخ شده ماهی بود و در طول دوره نگهداري در يخچال روند افزایشی نشان داد که اين روند افزایشی معنی دار نيز بود ($p<0.05$). حد مجاز برای شاخص ميكروبی Log cfu / gr $^{+/-} 10$ می باشد که در طول نگهداري گوشت چرخ شده ماهی اين شاخص كمتر از اين محدوده بوده است (ICMSF, 2002). افزایش بار كل باكتري برای هر تيمار در طول دوره نگهداري به ميزان دستکاري، ميزان رعيات اصول بهداشتی در روش‌های عمل‌آوري و ميزان اوليه باكتري بستگی دارد. تعداد كل باكتري های مزو菲尔 اوليه برای گونه‌های مختلف آب شيرين gr / Log cfu ۲-۶ Gimenez et al., 2002 پيشنهاد شده است (Arashisar et al., 2014; شان‌دهنده فلور ميكروبی و وضعیت بهداشتی آب محل

اسیدبوریک (٪W/V) و متيل رد به عنوان شاخص و سپس تيتر محلول تغيير رنگ داده حاصل با اسيدسولفوریک تا حاصل شدن رنگ ارغوانی، انجام می‌شد و به صورت ميلی‌گرم نيتروژن در ۱۰۰ گرم نمونه ماهی بيان گردید. ميزان بازهای نيتروژنی فرار از رابطه ذيل محاسبه شد. برای اندازه گيري اين شاخص نمونه‌برداری از نمونه‌ها در روزهای ۱۲، ۸، ۴، ۰ و ۱۶ نگهداري انجام شد. پس از ساخت رقت‌ها از روش پورپليت برای كشت رقت‌ها مختلف استفاده شد. تمامی تيمارها هر کدام با سه تكرار انجام شدند (Kuswandi et al., 2015).

رابطه (۱) حجم اسيد سولفوریک مصرفی $\times 14 = TVB-N$

تصويربرداری از تغییر رنگ حسگرها

تصويربرداری از نمونه‌ها به صورت منظم روزانه و در يك زمان و مكان مشخص توسط دوربين تمام ديجيتال SONY با لنز ۲۲ مگاپيكسل انجام شد. تصاویر بدست آمده برای آناليز ديجيتالي به كامپيوتر منتقل و سپس به نرم‌افزار فتوشاپ CS2017 منتقل شدند و پس از تبدیل شاخص RGB به صورت لكه‌ای با بزرگی $\times 31 \times 31$ پيكسل ابتدا average bluer گشته و سپس مقدار شاخص‌های تركيب رنگ آنها بدقت بررسی و از طريق فرمول ارزش رنگ در نرم‌افزار Exell2016 به ΔE تبدیل شدند. برای انجام اين شاخص، سه بسته گوشت چرخ شده ماهی با وزن ۵۰۰ گرم تهيه شده و حسگرهای برموفنول آبی، برموفنول سبز و برموفنول آبی بر پايه كيتوزان در درون بسته قرار داده شدند و تصويربرداری از تمامی آنها انجام گرفت (Kuswandi et al., 2012).

رابطه (۲) $\Delta E = \sqrt{(a_n - a)^2 + (b_n - b)^2 + (L_n - L)^2}$


L^* نشان‌دهنده شدت روشنائي، a^* به منزله سياه و b^* نشان‌دهنده پراكندگي روشنائي يا نور كامل $a^* =$ موقعیت آن بین سبز و قرمز متغیر است، مقادير منفی a^* نشان‌دهنده رنگ‌های سبز و مقادير مثبت آن به منزله رنگ‌های قرمز هستند.

هستند که این گازها به همراه سایر گازهای تولیدی، عوامل اصلی بوی بد ناشی از فساد محصول غذایی هستند که انواعی از حسگرها مثل حسگرها مثلاً Kuswandi *et al.*, 2014) Zaragozá *et al.*, 2011 با مکانیسم‌های مختلف قادر به جذب این گازها هستند و حضور آنها را در محیط نشان می‌دهند.

تغییرات pH

همانطوریکه در شکل ۲ نشان داده شده است، pH در طول دوره نگهداری در حال تغییر بوده و بیشترین مقدار آن مربوط به روز آخر دوره نگهداری (روز ۱۶) با مقدار ۶/۸۲ بوده است و اختلاف معنی‌داری نیز با سایر روزها نیز مشاهده شد ($p < 0.05$). مقدار pH گوشت ماهی بر حسب گونه آبزی متغیر است. از اینرو، هر چند pH شاخص دقیق و مناسبی برای تعیین تازگی و کیفیت اغلب آبزیان نیست، اما به عنوان یک شاخص تکمیل کننده برای سایر پارامترها استفاده می‌شود (Varlik *et al.*, 1993; Zaragozá *et al.*, 2014; ماہی می‌باشد (استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۸، ۱۳۸۶) که بر این اساس میزان pH در تمام تیمارهای مورد مطالعه طی دوره نگهداری در محدوده مجاز بوده‌اند. pH جمله فاکتورهای موثر بر رشد میکروبی و فساد غذاهast و در عین حال می‌تواند متأثر از فعالیت‌های میکروبیولوژیک باشد. pH عضلات ماهی زنده عموماً کمتر از ۷ بوده و مقدار آن ۷-۶/۵ است که با تغییر فصل، تغذیه و درجه حرارت بدن ماهی تغییر می‌کند (Kuswandi *et al.*, 2015). تجزیه ترکیبات نیتروزنی در طول نگهداری ماهی منجر به افزایش pH گوشت می‌شود که بخشی از این افزایش ممکن است مرتبه با تشکیل آمین‌هایی از قبیل آمونیاک و تری متیل آمین به دلیل تجزیه پروتئینی باشد که نشانگر رشد باکتری‌ها، کاهش کیفیت و در نهایت فساد ماهی است (Mohan *et al.*, 2008).


زندگی ماهی است. گروه اصلی میکروارگانیسم‌های مسئول فساد ماهی تازه نگهداری شده به صورت سرد، باکتری‌های سرمادوست گرم منفی هستند.



شکل ۱: تغییرات بار باکتریایی کل و باکتری سرمادوست در طول دوره نگهداری. وجود حروف متفاوت در هر ستون نشان از وجود اختلاف معنی دار آماری است ($p < 0.05$)

Figure 1: The total bacterial load changes and cool bacteria during storage


این باکتری‌ها قادرند در صفر درجه سلیسیوس یا بیشتر فعالیت نموده و تکثیر پیدا کنند. و باکتری‌ها پس از گذراندن فاز سکون یا فاز تاخیری Lag Phase و عادت به محیط، به سرعت وارد فاز لگاریتمی شده و در شرایط بی هوازی تکثیر یابند بطوریکه که تعداد آنها سرعت تا 10^8 -۱۰ در هرگرم عضله یا سانتی متر مربع پوست می‌رسد (Kuswandi *et al.*, 2011). افزایش تعداد باکتری‌ها در محیط یخچال معمولاً با تغییرات کیفی همراه است. با این حال عمدۀ تغییرات بوجود آمده ناشی از دو جنس غالب سودوموناس و آلترموناس است که دلیل آن کوتاه‌تر بودن زمان تکثیر در درجه حرارت پایین‌تر نسبت به سایر گونه ها می‌باشد (رضوی شیرازی، ۱۳۸۶). تغییرات باکتریایی از عوامل اصلی تولید گازهای ناشی از تغییر کیفیت محصول غذایی در طول نگهداری هستند. با افزایش دوره نگهداری تجمع گازهای موجود در بسته غذا افزایش می‌یابد و جذب این گازها توسط حسگرها می‌تواند یک کاندید مناسب برای تعیین مدت زمان نگهداری محصول غذایی باشد (Gimenez *et al.*, 2002; Kuswandi *et al.*, 2011). آمین‌ها گازهای اصلی تولیدی طی روند فساد میکروبی



شکل ۳: نمودار مربوط به تغييرات TVB-N در طول دوره نگهداري در دمای يخچال وجود حروف متفاوت در هر ستون نشان از وجود اختلاف معنى دار آماري است ($p<0.05$).

Figure 3: charts the changes TVB-N during storage at refrigerator temperature

تغييرات رنگ حسگر و شاخص های Lab
نتایج اين شاخص متناسب با جذب گازهاي حاصل از فساد درون بسته توسط حسگرها تغيير می‌کند. با افزایش فساد، رهایش گازها به درون بسته بيشتر می‌شود و اين امر می‌تواند سبب تغيير رنگ حسگرها شود. همانطوریکه در جدول ۱ مشخص است، شاخص روشنابی^{*} L در حسگرهاي برموفنول آبي بر پایه کاغذ صافی و بر پایه فيلم کيتوزان در طول نگهداري گوشت چرخ شده ماهی روند کاهشي نشان داده است که می‌توان آن را به جذب گازهاي حاصل از فساد توسط حسگرها و تغيير pH در آنها نسبت داد. اما اين شاخص در برموكروزول سبز روند مرتبی نشان نداد. شاخص^{*} a نيز در حسگرهاي برموفنول آبي بر پایه کاغذ صافی و بر پایه فيلم کيتوزان در طول نگهداري گوشت چرخ شده ماهی روند کاهشي نشان داده است. اين شاخص در حسگر برموكروزول سبز روند افزایشي نشان داد که اين اتفاق به ماهيت اين شناساگر بازمى گردد. زيرا اين حسگر در محيطهای قليائي بدين گونه عمل می‌کند. شاخص^{*} b در طول دوره نگهداري در تمامي حسگرها روند کاهشي نشان داده است که نشان دهنده قليائي شدن تمام حسگرها می‌باشد. تغييرات رنگي ايجاد شده در تمام حسگر به توليد تركيبات حاصل از فساد باكتريائي، اكسيداسيوني و شيميايي بازمى گردد.



شکل ۲: نمودار مربوط به تغييرات pH در طول دوره نگهداري در دمای يخچال وجود حروف متفاوت در هر ستون نشان از وجود اختلاف معنى دار آماري است ($p<0.05$) و حروف يكسان نشان از عدم اختلاف معنى دار آماري است ($p>0.05$).

Figure 2: Diagram of pH changes during storage at refrigerator temperature

تغييرات TVB-N

مجموع بازهاي نيتروژني آزاد TVB-N عموما به رشد باكتريها و فعالیت آنزيمهاي باكتريائي بر سويستراهاي پروتئيني مربوط می‌شود که با تخریب پروتئينها و Listyarinii et al. 2017 شکستن اسيدهای آمينه همراه می‌باشد (Dudnyk et al., 2017 ; al., 2017). سطح مجموع بازهاي نيتروژني آزاد همكاران، ۱۳۹۵). سطح مجموع بازهاي نيتروژني آزاد TVB-N به عوامل مختلفی از قبيل تولید آمينهاي مختلفی از قبيل آمونياك، هيستامين، پوتريسين، کادوارين و... بستگی دارد که تمامی اين تركيبات از تخریب پروتئينهاي موجود در گوشت حاصل می‌شوند (Kusawandi et al., 2011). با توجه به شکل ۳ مقدار اين شاخص در طول نگهداري در يخچال روند افزایشي داشت ($p<0.05$). مقادير مختلفی برای مقدار مجاز اين شاخص در قبيل ۳۰ mg N/100g است (Connell, 1990). تغيير در مقدار اين شاخص به عوامل مختلفی بستگی دارد و عوامل مهمی از قبيل فعالیت باكتريائي، خود گونه جاندار و شرایط نگهداري بر مقدار اين شاخص تاثير گذارند (Zaragoza et al., 2014).

جدول ۱: تغییرات شاخص‌های رنگی Lab حسگرها در طول نگهداری گوشت چرخ شده ماهی در یخچال

Table 1: Changes in Color Indicators Lab Sensors during the storage of minced meat in the refrigerator

تصویر	b	a	L	حسگرها	روز
	25/33	7/66	24/66	Br Blue	۰
	-5/66	-13/33	55	Br Green	۰
	38/66	6/33	37	Br B Chitosan	۰
	16/66	3/66	21/33	Br Blue	۱
	-10/33	-11/33	52/33	Br Green	۱
	29	1/33	24	Br B Chitosan	۱
	1	2/33	19/66	Br Blue	۲
	-9/33	-8/33	53/66	Br Green	۲
	29/66	-0/66	24	Br B Chitosan	۲
	0/33	2/33	18/66	Br Blue	۳
	-5/33	-7/66	49	Br Green	۳
	29	-0/33	23/33	Br B Chitosan	۳
	-4	1/33	12/33	Br Blue	۴
	-5/33	-6/33	52/66	Br Green	۴
	25/66	-1/66	18/33	Br B Chitosan	۴

Br Blue: Bromophenol blue

Br Green: Bromocresol green

Br B Chitosan: Bromophenol blue Chitosan.

تعیین همبستگی شاخص‌های فساد میکروبی با ΔE شاخص

همانطوریکه در جدول ۲ مشاهده می‌شود، میزان همبستگی بین شاخص‌ها متفاوت است و بالاترین نتایج همبستگی بین شاخص‌های مختلف و تغییر رنگ حسگرها در حسگر برموفنول آبی بالاترین همبستگی مشاهده شد و در تمامی حسگرها همبستگی‌های بدست آمده مقدار بالای مثبت ۵۰ درصد بوده که نشان از همبستگی بالا و

گروهی از این ترکیبات تولیدی، ترکیبات آمینی هستند که موجب قلیایی شدن محصول و اتمسفر داخل بسته‌ی غذا می‌شوند. در ادامه، نتایج تغییرات رنگی ایجاد شده در حسگرها با نتایج حاصل از مطالعات Kuswandi و همکاران (۲۰۱۵) و Kuswandi و همکاران (۲۰۱۱) همسو می‌باشند.

تشکر و قدوداني

اين پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت.

منابع

- استاندارد ملي ايران شماره ۱۰۲۸ ، ۱۳۸۶. گوشت و فرآوردهای آن. اندازه گیری pH . صفحات ۱-۸.
- بهرامي فر ، م.. روميانى ، ل.. و عسکري ساري ، ا.. ۱۳۹۴ مطالعه تاثير انواع بسته بندی برمانگاری فيله کپورعلفخوار (*Ctenopharyngodon idella*) در دمای يخچال ۴ درجه سانتي گراد. مجله علمي شيلات ايران، ۲۵(۳): ۷۲-۶۳.
- بهمني، ذ.. خانى پور، ع.. اروميه اي، ع.. مطلبى، ع.. ۱۳۹۵ بررسی عملکرد شناساگر تازگی در بسته بندی هوشمند فيله قزل آلای رنگين کمان (*Oncorhynchus mykiss*) طی مدت نگهداری در يخچال. مجله علمي شيلات ايران ، ۲۵(۳): ۱۲۱-۱۳۲.
- رضوي شيرازي، ح.. ۱۳۸۰ تکنولوژي فرآوردهای دريائي. انتشارات نقش مهر. ۲۹۲ صفحه.
- سالنامه آماري سازمان شيلات ايران، ۱۳۹۵ . سازمان شيلات ايران معاونت برنامه ريزی و توسعه مدیريت، دفتر برنامه و بودجه. ۶۴ صفحه.
- مجدى نسب، م.. سپيدنامه، م.. نگهداری فر، م.. ۱۳۹۶ تشخيص فساد ماهی قزل آلا (*Salmo trutta*) در طول نگهداری با استفاده از يك سنسور رنگ سنجي کاغذی ساده. علوم و صنایع غذایي ايران، ۱۵: ۳۰۲-۲۹۳.

Alasalvar, C., Shahidi, F., Miyashita, K. and Wanasantara, U., 2010. Seafood quality, safety, and health applications: an overview. Handbook of seafood quality, safety and health applications, pp.1-10.

Arashisar, S., Hisar, O., Kaya, M. and Yanik, T., 2014. Effects of modified atmosphere and vacuum packaging on microbiological and chemical properties of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*)

مناسب است و در تمامی آنها همبستگی ها معنی دار بوده است ($p < 0.05$). اين نتایج حاکی از آن است که از فساد میکروبی می تواند به عنوان يك شاخص مناسب برای شاخص تازگی در ساخت حسگرها مورد استفاده قرار گيرد. امروزه در مطالعات مختلفی مشاهده شده که به جای اينكه تنها يك حسگر برای تعیین تازگی مورد استفاده قرار گيرد، از مجموعهای از حسگرها استفاده می شود که به طور کلی به مجموع آنها "پد" گفته می شود. از مزایای بکار بردن همزمان چند حسگر برای تعیین تازگی دقت بالاتر و کاهش خطای تعیین تازگی با استفاده از شاخص تغییر رنگ است (Nurfawaidi and Kuswandi, 2017).

جدول ۲: میزان همبستگی شاخص های فساد میکروبی با شاخص ΔE

Table 2: The correlation between microbial spoilage indices with the index ΔE .

حسگرها	شاخص ها			
	TVB-N	PTC	TVC	pH
Br Blue	.912	.941	.989	.779
Br B Chitosan	.738	.763	.806	.749
Br Green	.669	.682	.755	.528

Br Blue: Bromophenol blue

Br Green: Bromocresol green

Br B Chitosan: Bromophenol blue Chitosan.

نتیجه گیری

در طول نگهداری ماهی یا فرآوردهای حاصل از آن شروع به کاهش کیفیت می کنند. کاهش کیفیت آنها با تجزیه سوبستراهاي پروتئینها و چربیها توسط ارگانیسم های مختلفی آغاز می شود و در ادامه با تولید ترکیبات مختلفی از قبیل ترکیبات نیتروژن دار ادامه می یابد. حسگرها ساخته شده با جذب ترکیبات حاصل از فساد مواد غذایی یونیزه شده و دچار تغییر pH می شوند و این حسگرها تغییر کیفیت را با تغییر رنگ نشان می دهند. همچنین نتایج حاصل از همبستگی نشان داد که حسگرهاي ساخته شده، دارای قابلیت تعیین تازگی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای بسته بندی شده هستند.

- fillets. *International Journal of Food Microbiology*, 97(2): 209-214. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2004.05.024
- Connell, J.J., 1990.** Control of Fish Quality. Published by Fishing News Book. 3rd edition, 122-150
- Dudnyk, I., Janeček, E.R., Vaucher-Joset, J. and Stellacci, F., 2018.** Edible sensors for meat and seafood freshness. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 259: 1108-1112. DOI: 10.1016/j.snb.2017.12.057
- Gimenez, B., Roncales, P. and Beltran, J.A., 2002.** Modified atmosphere packaging of filleted rainbow trout. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 82(10): 1154-1159. DOI: 10.1002/jsfa.1136
- International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF), 2002.** Micro-organisms in foods 7, microbiological testing in food safety management. Kluwer/ Plenum /Springer, London.
- Jorjani, S., 2014.** Chemical composition and fatty acid profile of common kilka (*Clupeonella cultriventris caspia*). *Caspian Journal of Environmental Sciences*, 12(1): 119-128.
- Kakaei, S. and Shahbazi, Y., 2016.** Effect of chitosan-gelatin film incorporated with ethanolic red grape seed extract and *Ziziphora clinopodioides* essential oil on survival of *Listeria monocytogenes* and chemical, microbial and sensory properties of minced trout fillet. *LWT-Food Science and Technology*, 72: 432-438. DOI: 10.1016/j.lwt.2016.05.021
- Kuswandi, B. and Nurfawaidi, A., 2017.** On-package dual sensors label based on pH indicators for real-time monitoring of beef freshness. *Food Control*, 82: 91-100. DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.06.028
- Kuswandi, B., Wicaksono, Y., Abdullah, A., Heng, L.Y. and Ahmad, M., 2011.** Smart packaging: sensors for monitoring of food quality and safety. *Sensing and Instrumentation for Food Quality and Safety*, 5(3-4), pp.137-146. DOI: 10.1007/s11694-011-.
- Kuswandi, B., Larasati, T.S., Abdullah, A. and Heng, L.Y., 2012.** Real-time monitoring of shrimp spoilage using on-package sticker sensor based on natural dye of curcumin. *Food Analytical Methods*, 5(4), pp.881-889. DOI: 10.1007/s12161-011-
- Kuswandi, B., Damayanti, F., Jayus, J., Abdullah, A. and Heng, L.Y., 2015.** Simple and low-cost on-package sticker sensor based on litmus paper for real-time monitoring of beef freshness. *Journal of Mathematical and Fundamental Sciences*, 47(3), pp.236-251. DOI: 10.5614%2Fj.math.fund.sci.2015.47.3.2
- Listyarini, A., Sholihah, W., Imawan, C. and Fitriana, R., 2017.** August. Colorimetric method by using natural dye for monitoring fish spoilage. In 2017 International Seminar on Sensors, Instrumentation, Measurement and Metrology (ISSIMM) (pp. 141-145). IEEE. DOI: 10.1109/ISSIMM.2017.8124279

- Mohan, C.O., Ravishankar, C.N. and Srinivasagopal, T.K., 2008.** Effect of O₂ scavenger on the shelf-life of catfish (*Pangasius sutchi*) steaks during chilled storage. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 88(3): 442-448. DOI: 10.1002/jsfa.3105
- Ojagh, S.M., Rezaei, M., Razavi, S.H. and Hosseini, S.M.H., 2010.** Development and evaluation of a novel biodegradable film made from chitosan and cinnamon essential oil with low affinity toward water. *Food Chemistry*, 122(1), pp.161-166. DOI: 10.1016/J.FOODCHEM.2010.02.033
- Ovissipour, M., Rasco, B., Shiroodi, S.G., Modanlow, M., Gholami, S. and Nemati, M., 2013.** Antioxidant activity of protein hydrolysates from whole anchovy sprat (*Clupeonella engrauliformis*) prepared using endogenous enzymes and commercial proteases. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 93(7):1718-1726. DOI: 10.1002/JSPA.5957
- Perafkandeh, F. and Keymaram, F., 2012.** Evaluation and determine the amount of recoverable reserves of Clupeonella cultriventris caspia (Svetovidov, 1941) in the the southern Caspian Sea, *Journal of Marine Science and Technology*, 11(3): 16-24.
- Prietto, L., Mirapalhete, T.C., Pinto, V.Z., Hoffmann, J.F., Vanier, N.L., Lim, L.T., Dias, A.R.G. and da Rosa Zavareze, E., 2017.** pH-sensitive films containing anthocyanins extracted from black bean seed coat and red cabbage. *LWT*, 80, pp.492-500. DOI: 10.1016/J.LWT.2017.03.006
- Silvestre, C., Duraccio, D. and Cimmino, S., 2011.** Food packaging based on polymer nanomaterials. *Progress in polymer science*, 36(12), pp.1766-1782. DOI: 10.1016/J.PROGPOLYMSCI.2011.02.003
- Varlik, C., Ugur, M., Gokoglu, N. and Gun, H., 1993.** Quality control methods and principals for aquaculture. *Istanbul Society of Food Technology*, 17, 98. .
- Zaragoz, P., Fernandez-Segovia, I., Fuentes, A., Vivancos, J.L., Ros-Lis, J.V., Barat, J.M. and Martnez-Mez, R., 2014.** Monitorization of Atlantic salmon (*Salmo salar*) spoilage using an optoelectronic nose. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 195, pp.478-485. DOI: 10.1016/J.SNB.2014.01.017
- Zhai, X., Shi, J., Zou, X., Wang, S., Jiang, C., Zhang, J., Huang, X., Zhang, W. and Holmes, M., 2017.** Novel colorimetric films based on starch/polyvinyl alcohol incorporated with roselle anthocyanins for fish freshness monitoring. *Food hydrocolloids*, 69, pp.308-317. DOI: 10.1016/J.FOODHYD.2017.02.014.

Comparison of the performance of bromophenol blue and bromocresol green Sensors in determining the microbial spoilage of (*Clupeonella cultriventris caspia*) stored in the refrigerator

Naghdi Sh.¹; Rezaei M.^{1*}; Bahramifar N.²

*rezai_ma@modares.ac.ir

1- Seafood Processing Department, Marine Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Noor, Iran

2- Environment Department, Marine Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Noor, Iran

Abstract

In this study, a sensor based on chitosan biofilm with bromophenol blue and bromocresol green sensors based on filter paper were used to determine the bacterial quality of common Kilka fish mince in refrigerated temperature. The total viable bacterial count (TVCs) on day zero was 3.473 log CFU / gr, which at the end of the storage period was changed to 6.497 log CFU / gr ($p < 0.05$). The psychrotrophic bacterial counts (PTCs) at the beginning storage time was a 1.473 log CFU / gr and increased during the refrigerated storage time and achieved to 7.516 log CFU / gr ($p < 0.05$). Total volatile basic nitrogen (TVB-N) at the beginning of the storage period was 7.01mg N/100g, which increased to 44.348 mg N/100g at the end of the storage ($p < 0.05$). The pH during storage time changed from 6.105 to 6.827 ($p < 0.05$). The correlation among microbial, chemical and color change values (ΔE) was different, and the highest correlation was observed in bromophenol blue indicator, which correlates with TVCs, The PTCs, TVB-N and pH were 0.941, 0.989, 0.912 and 0.779, respectively ($p < 0.05$). Based on the results of this study, it was found which bacterial and chemical changes spoilage in the minced fish package was simultaneous with the sensors color change and they show a quality decrease as form color change.

Keywords: Sensor freshness, Chitosan, Bacterial spoilage, Chemical spoilage, Mince fish

*Corresponding author